

ไดโคลฟีแนค โซเดียม ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เน้น 75 มิลลิกรัม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าไดโคลฟีแนค โซเดียม (diclofenac sodium) อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ และโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ในเด็ก
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน
- รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายหลังการบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด
- รักษาโรคเกาต์แบบเฉียบพลัน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- มีอาการปวดจากกรณีที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
- เป็นผู้ป่วยเด็ก
- มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติกระเพาะทะลุจากยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง
- เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ การติบตันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการแพ้และปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแผ่นหรือเกล็ด กลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสัน หนึ่งกำพร้าหลุดลอก
- หญิงมีครรภ์เดือนที่ 7-9 หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ นอกจากแพทย์สั่ง
- ระวังการรับประทานยานี้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของหัวใจ ตับ และไต บกพร่อง
- ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็ไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านปัจจัยการแข็งตัว เป็นต้น
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ไดโคลฟีแนคหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แนะนำกินครั้งละ 75 มิลลิกรัม (1 เม็ด) วันละ 1-2 ครั้ง
- ขนาดยาสูงสุด 150 มิลลิกรัมต่อวัน

วิธีใช้ยา

- รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตาม
- การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงงุน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาระดับประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวม น้ำคดไม่บูมที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559