

ออสิเมอทีนิน 40 และ 80 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม [ทาคริสโซ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ออสิเมอทีนิน มีไซเลท (osimertinib mesylate) เป็นยารักษาโรคมะเร็งในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง protein kinase

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งปอดในผู้ใหญ่ชนิดที่เรียกว่า 'non-small cell lung cancer'

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- แพ้ต่อตัวยาออสิเมอทีนินหรือส่วนประกอบอื่นใด
- กำลังรับประทานยาเซนต์จอห์นเวิร์ต

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น
 - มีอาการเจ็บป่วยจากอาการปอดอักเสบ (เป็นลักษณะของอาการเนื้อเยื่อในปอดอักเสบ)
 - เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ – อาจต้องให้แพทย์ที่ทำการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - เกิดอาการหายใจลำบาก ร่วมกับไอหรือมีไข้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 'อาการที่ต้องหยุดยา' ข้อ 5

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ขนาดยาที่แนะนำคือ เม็ดละ 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- หากจำเป็น แพทย์ที่ทำการรักษาอาจลดขนาดยาลงเป็นเม็ดละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- ใช้รับประทาน โดยกลืนเม็ดยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำ ห้ามบด หักแบ่ง หรือเคี้ยวเม็ดยา
- รับประทานทุกวันในเวลาเดียวกัน
- สามารถรับประทานยานี้ร่วมกับอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมรับประทานยาหนึ่งมื้อ ให้รับประทานยาในทันทีที่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากกระยะห่างระหว่างมื้อถัดไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ไม่ต้องรับประทานยาที่ลืม และรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาเดิม

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์ที่ทำการรักษา หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- เกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์มากขึ้น

- ให้หยุดสูบบุหรี่และปรับขนาดการใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ อย่างเคร่งครัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- เกิดอาการหายใจลำบากร่วมกับอาการไอหรือมีไข้ – ซึ่งอาจเป็นอาการแสดงของโรคปอดอักเสบ (ชนิดที่เรียกว่า เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ หรือ ILD) และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในบางราย

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสีย
- ปัญหาที่ผิวหนังและเล็บ
- ปากอักเสบ
- จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (ลิวโคไซต์หรือนิวโทรฟิล) ลดลงผิดปกติ
- จำนวนเกล็ดเลือดลดลง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ควรเก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- ห้ามใช้ยานี้หลังวันหมดอายุ (EXP) ที่ระบุไว้บนแผงยาและกล่องยา
- วันหมดอายุ หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนนั้น
- ยานี้ไม่ต้องการการเก็บรักษาพิเศษใดๆ
- ห้ามใช้ยานี้หากแผงยาฉีกขาด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์
- ห้ามทิ้งยาลงในน้ำเสียหรือขยะในครัวเรือน ควรถามเภสัชกรถึงวิธีทิ้งยา

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร