

เบตาเมทาโซนาลอเรด

ความแรงร้อยละ 0.1

ชนิดยาทาครีม

[ข้อการคำ]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

เบตาเมทาโซนาลอเรด เป็นยาทาชนิดครีม จัดอยู่ในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทาเบตาเมทาโซนาลอเรด เป็นยาครีม ทาผิวหนัง ใช้รักษาอาการอักเสบ บวม แดง คัน และระคายเคือง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ชนิดต่าง ๆ หรือผื่นแมลงกัดต่อย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มสเตอรอยด์ชนิดอื่น
- กำลังเป็นสิิวบางชนิดเพราะยาอาจกระตุ้นให้สิิวบางชนิดกำเริบได้ กำลังติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เช่น อีสุกอีใส หูด
- กำลังติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังโดยไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
- กำลังติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อรา
- ห้ามทายาในดวงตาหรือบริเวณใกล้ตา ทวารหนัก และอวัยวะเพศ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็ก เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ

- เป็นโรคติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน
- มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดผิดปกติ เพราะอาจทำให้เกิดแผลได้
- เป็นโรคเบาหวาน เพราะอาจทำให้แผลที่ผิวหนังหายช้า
- เป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะอาจกระตุ้นให้โรคกำเริบมากขึ้น
- โรคต่อหินหรือต่อกระจก เพราะยาเพิ่มความดันในลูกตา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้สะอาด และล้างมือหลังจากทายา ยกเว้นกรณีทายาเพื่อรักษาที่มี
- ทายาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ไม่ใช่วัสดุใด ๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจากใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณใบหน้า ข้อพับ และรักแร้

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายานี้ ควรทาทันทีที่นึกได้

- ถ้าลืมทายานี้แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอทาครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป ถ้าผู้ป่วยกลืนยานี้ในปริมาณมาก ควร**บ้วนปาก** ด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยานี้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส หรือโรคหัดระหว่างที่ใช้ยานี้
- หากยาสัมผัสบริเวณจมูกหรือปากควรล้างด้วยน้ำปริมาณมาก
- ห้ามหยุดใช้ยาหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามใช้ยาปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง **หยุดยา** แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก หายใจเสียงวี๊ด ตาบวม หน้บวม ปากบวม เจ็บแน่นหน้าอก มีผื่น
- ผิวหนังบางเกิดจ้ำเลือดง่าย
- ผิวหนังเปลี่ยนสีปวดคัน และมึนปัญหาการมองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น บวม แดง ร้อน มีหนองหรือ ปุ่มรากขนอักเสบ

- แผลบริเวณผิวหนังหายช้า
- หากทายาในปริมาณมาก หรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน และใช้วัสดุปิดทับผิวหนังที่ทายา อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น หน้าบวม ตัวบวม น้ำหนักเพิ่ม ความดันโลหิตสูง ขนหรือผมดกขึ้น

5.2 อาการที่**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังแดง แสบ คัน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

26 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร