

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต

ความแรงร้อยละ 0.05

ชนิดยาทาโลชั่น

[ข้อการคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสำคัญคืออะไร

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต เป็นยาทาชนิดโลชั่น จัดอยู่ในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทาเบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต เป็นยาโลชั่นทาผิวหนัง ใช้รักษาอาการอักเสบ บวมแดงคัน และระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ชนิดต่าง ๆ โรคสะเก็ดเงิน รวมทั้งโรคผิวหนังอื่น ๆ และยานี้สามารถใช้กับรอยโรคบริเวณหนังศีรษะและบริเวณผิวหนังที่มีขนได้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- มีประวัติแพ้ยาเบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต ยาสเตอรอยด์ชนิดอื่น หรือส่วนประกอบอื่นในยาโลชั่น
- กำลังเป็นสิ่วบางชนิดเพราะยาอาจกระตุ้นให้สิ่วบางชนิดกำเริบได้
- กำลังติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เช่น อีสุกอีใส งูสวัด เริ่ม
- กำลังติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
- กำลังติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง
- กำลังติดเชื้อราที่ผิวหนังและปากอักเสบจากเชื้อรา
- กำลังมีผิวหนังอักเสบบริเวณรอบปาก
- กำลังเป็นผื่นผ้าอ้อม
- มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ
- มีแผลบริเวณผิวหนัง หรือมีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
 - ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - ผู้มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดผิดปกติ
 - ผู้เป็นโรคเบาหวาน
 - ผู้เป็นโรคต่อหินหรือต่อกระຈ
 - ไม่ควรทายาบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะใกล้ดวงตา ท้องแขน รวมทั้งขาหนีบยกเว้นการใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
 - ไม่ควรใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสติกปิดทับบริเวณที่ทายา
 - ไม่ควรใช้ยาอื่นที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ร่วมด้วยเมื่อใช้ยานี้
 - หากรอยโรคไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมบุตร
 - มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
 - มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้สะอาดและล้างมือหลังจากทายา ยกเว้นกรณีทายาเพื่อรักษาที่มือ ทายาบาง ๆ บริเวณ

ผิวหนังหรือหนังศีรษะที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

- ไม่ใช้วัสดุใด ๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจากเป็นคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรโดยเฉพาะในเด็ก
- ไม่ควรใช้ยาต่อไปในกรณีรอยโรคหายดีแล้วหรือใช้ยานานเกิน 2-4 สัปดาห์โดยไม่ได้รับการคำแนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณใบหน้า ใกล้ดวงตา ขอพับ รักแร้ และบริเวณผื่นผ้าอ้อม หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- ในกรณีจำเป็นต้องใช้ยาในเด็ก ไม่ควรทายานานเกิน 5 วัน ไม่ควรทายาในปริมาณมากเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลานาน เช่น ทายาทุกวันติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายานี้ ควรทาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมทายานี้แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอทาครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทายา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป อาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ถ้ากลืนยานี้ในปริมาณมาก ควรบ้วนปากด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยาหากใช้ยานี้แล้วมี

อาการระคายเคืองผิวหนัง หรือผิวหนังบางลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- แฉกแพทย์ หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- แฉกแพทย์หรือเภสัชกร หากสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส หรือ โรคหัด ระหว่างที่ใช้ยานี้
- ห้ามหยุดใช้ยาหรือใช้ยาปริมาณมากเป็นระยะเวลานานเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามให้ยาแก่ผู้อื่นที่มีอาการคล้ายกัน
- ยานี้ไม่สามารถใช้ทดแทนยาชาเข้าได้ และอาจทำให้การติดเชื้อมันแย่ลงได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากสงสัยว่ามีการติดเชื้อ

5.อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มือบวม แขนบวม เวียนศีรษะรุนแรง
- ผิวหนังบาง เกิดจ้ำเลือดง่าย หรือเป็นจุดแดงคล้ำ
- ผิวหนังเปลี่ยนสี
- ปวดศีรษะ และมีปัญหาการมองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น บวมแดง ร้อน และอาการระคายเคืองผิวหนัง มีหนองหรือน้ำเหลืองซึม ปุ่มรากขนอักเสบ
- แผลบริเวณผิวหนังหายช้า
- หากทายาในปริมาณมากหรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด ปวดศีรษะ ข้อเท้าหรือเท้าบวมกระหายน้ำมากขึ้น อยากรับประทานมากขึ้น ปัสสาวะมากขึ้น ขนหรือผมดกขึ้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิวหนัง เช่น ผิวหนังแดง ปวดแสบร้อน คัน ผิวหนังแห้ง มีผื่นมีผด ผิวหนัง

อักเสบ เป็นสิ่ว ผิวหนังดิ่ง หรือผิวหนังเป็นรอยแตก ผิวแตกลาย ผิวลอกรู้สึกเหมือนถูกแมลงกัดต่อย

- มีผื่นแดงหรือคันรอบริมฝีปาก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
24 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร