

เบตาเมทาโซนวาเลอเรต
ความแรงร้อยละ 0.1
ชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก
[ข้อการคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสำคัญอะไร

เบตาเมทาโซนวาเลอเรตเป็นยาทาชนิดน้ำ สารละลายทาภายนอก จัดอยู่ในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทาเบตาเมทาโซนวาเลอเรต เป็นยาทา ชนิดน้ำสารละลายทาผิวหนัง ใช้รักษาอาการอักเสบ บวม แดง และคัน เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ชนิด ต่าง ๆ หรือผื่นแมลงกัดต่อย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มสเตอรอยด์ชนิดอื่น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้ โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็ก เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็น เวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
 - เป็นโรคติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือมี ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน
 - มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียน เลือดผิดปกติ เพราะอาจทำให้เกิดแผลได้ง่าย
 - เป็นโรคเบาหวาน เพราะอาจทำให้แผลที่ ผิวหนังหายช้า
 - เป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะอาจกระตุ้นให้โรค กำเริบมากขึ้น
 - แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านอยู่ใน กลุ่มต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มที่จะ ตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการ ใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้ สะอาด
- ทายาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกร แนะนำ
- ไม่ใช่วัสดุใดๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจาก เป็นคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณใบหน้า ข้อพับ และรักแร้

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายานี้ ควรทาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมทายานี้แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้ รอคอยครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่า เดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป ถ้า ผู้ป่วยกลืนยานี้ในปริมาณมาก ควรบ้วนปาก ด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- หากยาสัมผัสบริเวณจมูกหรือปากควรล้างด้วยน้ำ ปริมาณมาก

- ไม่ควรใช้ยาเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่แพทย์ หรือเภสัชกรแนะนำ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก หายใจเสียง วี๊ด ตาบวม หน้าบวม ปากบวม เจ็บแน่น หน้าอก มีผื่น
- ผิวหนังบางเกิดจ้ำเลือดง่าย
- ผิวหนังเปลี่ยนสี ปวดศีรษะ และมีปัญหาการ มองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น บวม แดง ร้อน มีหนอง หรือ ปุ่มรากขนอักเสบ
- หากทายาในปริมาณมาก หรือใช้ยาเป็นระยะ เวลานาน และใช้วัสดุปิดทับผิวหนังที่ทายา อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น หน้าบวม ตัวบวม ขนหรือผมดกขึ้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคืองผิวหนัง แสบ คัน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ห้องน้ำ
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
26 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร