

แอสซิโทรไมซิน
ชนิดหยอดตา
ขนาด 15 มิลลิกรัม ใน 1 กรัม
[ข้อการค้า]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- แอสซิโทรไมซิน ไดไฮเดรต (azithromycin dihydrate) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มแมคโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น เยื่อตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้หรือยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์หรือแพ้ส่วนประกอบในยานี้
- หากท่านกินยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนได้แก่ เออร์โกทามิน
- หากท่านเป็นโรคตับขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - ปัญหาโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ
- โรคเบาหวาน
- ให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบสนองต่อการรักษา

3.2 หากลืมหยดยา ควรทำอย่างไร

- หยดยาทันทีที่นึกได้ หยดยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามหยดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าหยดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยา

4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หยดยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- เป็นตุ่มพอง ผื่นคันบวม แดง หลุดลอก
- คลื่นไส้
- มีไข้สูง หนาวสั่น ไอ และเจ็บคอ
- หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ
- ชัก
- ตัวเหลือง ตาเหลือง

- สูญเสียการได้ยิน
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาเจียนใน 1 ชั่วโมงหลังหยดยา
- ถ่ายเหลวรุนแรง หรือปนเลือด อุจจาระสีดำหรือสีซีด บัสสาวะผิดปกติ (ปริมาณและความถี่) บัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ

5.2 อาการที่ **ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน
- ปวดข้อ
- ชาตามร่างกาย
- เป็นผื่นคัน
- มีเสียงในหู
- ผิวหนังไวต่อแสง
- อ่อนเพลียผิดปกติ
- การรับรสไม่ดี เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเดิน
- มีฝ้าขาวในปาก คอ คันช่องคลอด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา (อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เมื่อเปิดใช้ยาเกิน 14 วัน ให้ทิ้งยา
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
20 มิถุนายน 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร