

**เมบендาโซล 100 มิลลิกรัม และ 500
มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคี้ยว**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาถ่ายพยาธิ มีชื่อสามัญว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคพยาธิในเด็ก เช่นพยาธิเข็มหมุด พยาธิแส้นแม่ พยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
- กำลังตั้งครรภ์

2.2 ข้อควรระวัง

- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ถ้ากำลังให้นมบุตร เป็นโรคตับ เป็นโรคล้าไส้อักเสบเรื้อรัง
- อย่าใช้ยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยาอาจกดไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำและติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย
- อย่าใช้ร่วมกับยาต้านแบคทีเรียชื่อ เมโตรนิดาโซล (metronidazole) เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการแพ้

ทางผิวนังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

- อย่าใช้กับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้เด็กชักได้ (มีโอกาสเกิดได้น้อย)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยานี้ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง
- อย่ากินยานี้ในขนาดสูง หรือกินอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาครั้งที่ 2 ในอีก 2 สัปดาห์ให้กินยาทันทีที่นึกได้ ไม่ควรเก็บสัปดาห์ที่ 3 หลังจากกินครั้งแรก

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ห้องร่วง หากมีอาการที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ**

12 พฤษภาคม 2559

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่มีข้อควรปฏิบัติเป็นพิเศษ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา และรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก คัน ผื่นแดง ผิวนังหลุดลอก ผอมร่วง ตุ่มพองที่ผิวนังร่วมกับเจ็บในปากและตา
- อาการไขกระดูกถูกกด เช่น ไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ชัก เนื้อoyer หรืออ่อนเพลีย ผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห่องเสียปอดท้อง
- เวียนศีรษะปอดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียนเบื้องอาหาร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยห้ามห้อง ("ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) "ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก