

**นอร์ฟลอกซาซิน 200 มิลลิกรัม และ
400 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มควิโนโลน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกรวยไตอักเสบที่มีอาการไม่รุนแรง
- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของลำไส้ใหญ่ เช่น โรคบิดจากเชื้อชิกเกลลา

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

- หมายเหตุ โรคท้องร่วงส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ก่อนใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้ หรือแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันได้แก่ ยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เช่น ซิโพรฟลอกซาซิน โอฟลอกซาซิน ลีโวฟลอกซาซิน มอกซิฟลอกซาซิน และซิตาฟลอกซาซิน

- หากท่านมีประวัติเอ็นซอต่ออักเสบ หรือเอ็นซอต่ออักเสบขาดจากการใช้ยานอร์ฟลอกซาซิน หรือยากุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้**
 - เป็นโรคที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี เนื่องจากอาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายขึ้น
 - เป็นโรคลมชัก หรือมีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจากยานี้อาจกระตุ้นสมองและอาจทำให้ชักได้ง่ายขึ้น
 - เป็นโรคลำไส้อักเสบบางชนิด เนื่องจากอาจทำให้โรคกำเริบและอาจทำให้เกิดท้องร่วงจากการอักเสบของลำไส้อันเนื่องมาจากยาปฏิชีวนะได้
 - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรง เนื่องจากอาจทำให้หายใจลำบากหรือเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรง
 - เป็นโรคหัวใจหรือมีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ เนื่องจากอาจทำให้อาการกำเริบซึ่งในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
 - เป็นเบาหวาน เนื่องจากอาจทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี
- **ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้น ได้แก่**
 - เป็นโรคไต โดยเฉพาะหากไตเสื่อมมาก เนื่องจากยาจะตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะขับออกได้น้อยลง หาก

จำเป็นต้องใช้ยาต้องได้รับการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสม

- **ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่**
 - เด็ก
 - หญิงมีครรภ์
 - สตรีให้นมบุตรจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานอร์ฟลอกซาซินกับผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ**
 - นม ยาลดกรด วิตามินที่มีส่วนผสมของแคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม เพราะอาจทำให้การดูดซึมยาลดลง แต่อาจใช้ได้หากกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 - ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่นวอร์ฟาริน เพราะอาจทำให้เลือดออกง่าย
- **ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้นและทำให้ผิวหนังไหม้จากแสงได้ จึงไม่ควรทำงานหรือ อยู่ในที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน และควรป้องกันตัวเองจากแสงแดด**
- **ยานี้อาจทำให้ปลายประสาทอักเสบ**
- **รับประทานยานี้แล้วอาจมีอาการง่วงซึม ไม่ควรขับรถหรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ควรกินยาตอนท้องว่าง คือ ก่อนอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหารหรือหลังดื่มนมอย่างน้อยสองชั่วโมง
- ควรกินยาตรงเวลา ให้ระยะห่างของการกินยาแต่ละมื้อเท่ากัน ทุก 12 ชั่วโมง จะทำให้ระดับยาในเลือดและปัสสาวะคงที่และช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น
- กินยาให้ครบตามระยะเวลาการรักษาหรือตามที่แพทย์สั่งจนหมด แม้จะรู้สึกว่าการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะถ้าท่านหยุดยาก่อนอาจทำให้การฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์และอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้
- ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โรคติดเชื้อที่เป็น ให้ใช้ตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก หัวใจเต้นเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา ได้แก่ ผื่นคัน ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก ผื่นแดง ผิวนิวหรือตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก
- ชัก
- เส้นเอ็นบริเวณไหล่ มือ หรือข้อเท้ามีอาการปวด บวม โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ผื่นหนังอักเสบหลังถูกแสงแดด
- มีอาการปวด แสบร้อน รู้สึกเหมือนมีเข็มตำ ขา และการอ่อนแรงของแขนขา ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด อุณหภูมิหรือการทรงตัวของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ง่วงนอน เหนื่อยชาผิดปกติ
- ปวดศีรษะ เวียนหัว ง่วงนอน หรือนอนไม่หลับ
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย หรือท้องผูก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา หรือเก็บยานี้ในซองทิบหรือขวดสีชาที่ปิดสนิทและไม่ให้ยาโดนแสงโดยตรง
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
10 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร