

โอฟล็อกซาซิน 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- โอฟล็อกซาซิน (Ofloxacin) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มควิโนโลน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกรวยไตอักเสบ
- ใช้รักษาการติดเชื้อวัณโรค

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

- หมายถึง โรคที่ก่อร่างส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ก่อนใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้ หรือแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันได้แก่ ยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน เช่น นอร์ฟลอกซาซิน ซิโพรฟลอกซาซิน ลีโวฟลอกซาซิน มอกซิฟลอกซาซิน และซิตาฟลอกซาซิน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้

- เป็นโรคที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี เนื่องจากอาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายขึ้น

- เป็นโรคลมชัก หรือมีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจากยานี้อาจกระตุ้นสมองและอาจทำให้ชักได้ง่ายขึ้น

- เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางชนิด

เนื่องจากอาจทำให้โรคกำเริบและอาจทำให้เกิดท้องร่วงจากการอักเสบของลำไส้อันเนื่องมาจากยาปฏิชีวนะได้

- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรง เนื่องจากอาจทำให้หายใจลำบากหรือเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแรง

- เป็นโรคหัวใจหรือมีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ เนื่องจากอาจทำให้อาการกำเริบซึ่งในบางกรณีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

- เป็นเบาหวาน เนื่องจากอาจทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี

• ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้น ได้แก่

- เป็นโรคไต โดยเฉพาะหากไตเสื่อมมาก เนื่องจากยาจะตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะขับออกได้น้อยลง หากจำเป็นต้องใช้ยาต้องได้รับการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสม

• ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่

- เด็ก
- หญิงมีครรภ์
- สตรีให้นมบุตร

จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา โอฟล็อกซาซินกับผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว

• ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ

- นม ยาลดกรด วิตามินที่มีส่วนผสมของแคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม เพราะอาจทำให้การดูดซึมยานี้ลดลง แต่อาจใช้ได้หากกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่นวอร์ฟาริน เพราะอาจทำให้เลือดออกง่าย

• ยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้นและทำให้ผิวหนังไหม้จากแสงได้ จึงไม่ควรทำงานหรือ อยู่ในที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน และควรป้องกันตัวเองจากแสงแดด

- ยานี้อาจทำให้ปลายประสาทอักเสบ
- รับประทานยานี้แล้วอาจมีอาการง่วงซึม ไม่ควรขับรถหรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ควรกินยาตอนท้องว่าง คือ ก่อนอาหารเช้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหารหรือหลังดื่มนมอย่างน้อยสองชั่วโมง
- ควรกินยาตรงเวลา ให้ระยะห่างของการกินยาแต่ละมื้อเท่ากัน ทุก 12 ชั่วโมง จะทำให้ระดับยาในเลือดและปัสสาวะคงที่และช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น

- กินยาให้ครบตามระยะเวลาการรักษา หรือตามที่แพทย์สั่งจนหมด แม้จะรู้สึก ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะถ้าท่าน หยุดยาก่อนอาจทำให้การฆ่าเชื้อไม่ สมบูรณ์และอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อ ื้อยาได้
- ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โรคติดเชื้อที่เป็น ให้ใช้ ตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอะไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับ มือถัดไป ให้เว้นยาในมือนั้น แล้วรอกิน ยาของมือต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่ม เป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควร ทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมี อาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก หัว ใจเต้นเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ ของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจาก ยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบ แพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา ใต้แก้ม ผื่นคัน ลมพิษ บวม ที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืน ลำบาก ผื่นแดง ผิวไหม้หรือตุ่มพอง ผิวหนึ่งหลุดลอก
- ชัก
- เส้นเอ็นบริเวณไหล่ มือ หรือข้อเท้ามี อาการปวด บวม โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ผิวหนึ่งอักเสบหลังถูกแสงแดด
- มีอาการปวด แสบร้อน รู้สึกเหมือนมี เข็มตำ ชา และการอ่อนแรงของแขน ขา ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกสัมผัส ความเจ็บปวด อุณหภูมิหรือการทรงตัว ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ ทันที

- ง่วงนอน เหนื่อยชาผิดปกติ
- ปวดศีรษะ เวียนหัว ง่วงนอน หรือนอน ไม่หลับ
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ไม่สบาย ท้อง ท้องเสีย หรือท้องผูก

6. ควรกินยานี้อย่างไร

- กินยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้ รับมา หรือเก็บยานี้ในซองที่ปิดหรือขวด

สีชาที่ปิดสนิทและไม่ให้ยาโดนแสง โดยตรง

- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละ ครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสง โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่ อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศา เซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
12 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อ สงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร