

**แอสซิโทรไมซิน  
ชนิดผงบรรจุซอง  
ขนาดของละ 100 มิลลิกรัม  
[ข้อการคำ]**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

- แอสซิโทรไมซิน ไดไฮเดรต (azithromycin dihydrate) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มแมคโครไลด์

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นนอก หรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

- 1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**

- เคยแพ้ยานี้หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไลด์ หรือแพ้ส่วนประกอบในยานี้
- หากท่านกินยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ได้แก่ เออร์โกทามิน
- หากท่านเป็นโรคตับขั้นรุนแรง

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
  - ปัญหาโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
  - ให้นมบุตร

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบสนองต่อการรักษา

**3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร**

- กินยาทันทีที่นึกได้ กินยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล บาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา**

**4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร**

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- กินยานี้ในขณะที่ท้องว่าง คือกินยา 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- เป็นตุ่มพอง ผื่นคันบวมแดง หลุดลอก
- ลิ้นสีซีด
- มีไข้สูง หนาวสั่น ไอ และเจ็บคอ
- หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ
- ชัก
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- สูญเสียการได้ยิน

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาเจียนใน 1 ชั่วโมงหลังกินยา
- ถ่ายเหลวรุนแรง หรือปนเลือด อุจจาระสีดำหรือสีซีด บั๊สสาวะผิดปกติ (ปริมาณและความถี่) บั๊สสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน
- ปวดข้อ
- ชาตามร่างกาย
- เป็นผื่นคัน
- มีเสียงในหู
- ผิวหนังไวต่อแสง
- อ่อนเพลียผิดปกติ
- การรับรสไม่ดี เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเดิน
- มีฝ้าขาวในปาก คอ คันช่องคลอด

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

2 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร