

ทิน็อกซิแคม 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าทิน็อกซิแคม (tenoxicam) อยู่ใน
กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยา
แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติเลือดออก
ในทางเดินอาหารหรือกระเพาะทะลุจากการใช้ยาต้าน
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- เป็นสตรีมีครรภ์ไตรมาสที่สาม
- มีการทำงานของหัวใจล้มเหลว การทำงานของตับ
หรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
- เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผล
ในกระเพาะอาหารและลำไส้ การตีบตันของหลอดเลือด
เลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
- ยานี้ อาจทำให้เกิดอาการแพ้และปฏิกิริยาทางผิวหนัง
อย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแผ่นหรือเกล็ด กลุ่ม
อาการสตีเวนจอห์นสัน หนักกำพราห์หลุดลอก
- ยานี้ มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควร
หลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะไข้เลือดออก หรือ
เกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านปัจจัย
การแข็งตัว เป็นต้น
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลขนาดยา และความปลอดภัยในการใช้
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ยา
ทิน็อกซิแคม หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ขนาดยาที่แนะนำ กินยาวันละครั้ง ครั้งละ 20 มิลลิกรัม
- #### วิธีใช้ยา
- รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 - การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง
เช่น ง่วงงุน ซึม ชีพ คื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้
รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษารูปแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- หากกินยานี้แล้วมีอาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม ไม่ควร
ขับขี่ยานพาหนะ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่เสี่ยง
อันตรายที่ต้องใช้ความตื่นตัวสูง
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่า
เกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง
ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ
ผื่น อาการบวม น้ำกัดไม่มุ่มที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป
ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร