

## เวโดลิซูแมบ

300 มิลลิกรัม

ชนิดยาผงที่ต้องละลายสำหรับฉีดแบบ  
หยดเข้าหลอดเลือดดำ

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เวโดลิซูแมบ (vedolizumab) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งเป็นยาที่จับแบบจำเพาะกับเซลล์หรือโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งในร่างกายที่ต้องการให้ยาทำลาย และทำให้เกิดการทำลายเซลล์หรือโปรตีนชนิดนั้น

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
- รักษาโรคโครห์นระดับปานกลางถึงรุนแรง

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีอาการติดเชื้อรุนแรง เช่น ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในระบบประสาท

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร เนื่องจากยานี้อาจผ่านเข้าสู่น้ำนมได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

### 3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล โดยแพทย์จะกำหนดเวลาให้ท่านมารับยาเป็นระยะ

#### 3.2 หากลืมมารับยาควรทำอย่างไร

- ถ้าเกิดลืมมารับยาตามนัด ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำนัดหมายรับยาครั้งถัดไป

#### 3.3 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- หลังจากฉีดยาให้ระมัดระวังการขยับเขยื้อนย่นต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หากจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน ให้แจ้งแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกร ว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
- ให้รีบแจ้งแพทย์ หากใช้ยานี้เกิน 14 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มองเห็นไม่ชัด สูญเสียการมองเห็น พุดลำบาก แขนหรือขาอ่อนแรง การเดินผิดปกติหรือมีปัญหากการทรงตัว มีอาการชาเป็นเวลานาน ความรู้สึกรับรสลดลง

หรือสูญเสียการรับรส สูญเสียความทรงจำชั่วคราวหรือสับสน

- มีการติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ เช่น มีอาการไอ หนาวสั่น ไออย่างรุนแรงและต่อเนื่อง หรือมีไข้สูง
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

- อาการหวัด
- ปวดศีรษะ
- ปวดตามข้อ
- มีอาการระคายเคือง หรือเจ็บบริเวณตำแหน่งที่ให้ยา

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตโดย Hospira Inc., United State of America นำเข้าโดย บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย)จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ผู้แทนจำหน่ายโดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 สิงหาคม 256

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

