

เวลาดาฟาซีน  
37.5, 75, 150 มิลลิกรัม  
ชนิดแคปซูลปลดปล่อยแบบทยอย  
[ข้อการคำ]

## 1. ยาี้คือยาอะไร

### 1.1 ยาี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยาี้มีชื่อสามัญว่า เวลาดาฟาซีน (venlafaxine) เป็นยาแก้ซึมเศร้า

### 1.2 ยาี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาี้ใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคตื่นตระหนก และโรคกลัวการเข้าสังคม

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยาี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นๆในตัวยา
- ถ้าท่านกินยากลุ่มยับยั้งโมโนเอามีนออกซีเดสแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible MAOI) ที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าหรือโรคพาร์กินสัน ควรหยุดยาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนกินยาี้ และควรหยุดยาี้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนใช้ยากลุ่มยับยั้งโมโนเอามีนออกซีเดส (MAOI) ยาีลีเนโซลิด และยาเมทิลีนบลูสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เนื่องจากสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตได้
- มีความเสี่ยงสูงในการเกิดหัวใจเต้นเสี้ยงหะ เช่น ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาี้ ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยาี้มากขึ้น เช่น
  - โรคเบาหวาน
  - โรคหัวใจ
  - มีประวัติเลือดออกผิดปกติ
  - มีประวัติเป็นโรคลมชัก
  - ประวัติตนเองหรือครอบครัวมีภาวะวิกลจริต
  - ดอหินนมปิด
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  - หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยาี้
  - แจ้งแพทย์หากตั้ง ครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
  - หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาี้ หรือหยุดให้นมบุตรระหว่างใช้ยาี้
- ไม่ควรใช้ยาี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาลดน้ำหนักเฟนิเทอรามีน • กลูเมายยับยั้งโมโนเอามีนออกซีเดส

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาี้ในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน กลืนยาพร้อมน้ำโดยไม่บดหรือเคี้ยว
- กินยาพร้อมอาหาร

### 3.2 หากลิมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมือต่อไป ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ห้ามกินมากกว่าปริมาณยาที่ได้รับในแต่ละวัน

### 3.3 ถ้ากินยาี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็ว เปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว (ตั้งแต่วงนอนไปถึงอาการโคม่า) สายตาพร่ามัว ชักหรือเกร็ง และอาเจียน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยุดยาหรือลดขนาดยาเอง และให้กินยาี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา เพราะยาี้อาจทำให้เกิดความคิดและมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย หรือเกิดอาการซึมเศร้าแยง โดยเฉพาะในเด็ก วัยรุ่น ภายใน 2-3 เดือนแรกของการรักษา หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา
- หลีกเลียงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

## 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตาม ผื่นหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มีความคิดของการทำร้ายหรือฆ่าตัวตาย
- หัวใจเต้นเร็วหรืออัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
- ตาพร่ามัว รูม่านตาขยาย
- ปากแห้ง เวียนหัว ปวดคล้ายเข็มตำ เคลื่อนไหวผิดปกติ ชักหรือเกร็ง
- คลื่นไส้
- เหงื่อออก
- สมาธิสั้น เคลิ้มสุข
- เกิดอาการถอนยา เช่น เหนื่อย เวียนหัว นอนไม่หลับ ผื่นร้าย ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เหงื่อออก ไม่อยากอาหาร
- กลุ่มอาการซีโรโทนิน เช่น รู้สึกร้อนรน อยู่นิ่งไม่ได้

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทน  
จำหน่าย.....  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ  
20 มิถุนายน 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อ  
สงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือ  
เภสัชกร

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว