

ราเบพราโซล

ความแรง 10 มิลลิกรัม, 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ราเบพราโซล (rabeprazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร/ลำไส้เล็กส่วนต้น
- รักษาโรคกรดไหลย้อน หรือ ภาวะกรดเกิน
- รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- รักษาภาวะที่กระเพาะอาหารสร้างกรดจำนวนมากกว่าปกติ(กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยากลุ่มยับยั้งการหลังกรดตัวอื่น เช่น โอมิพราโซล แลนโซพราโซล แพนโทพราโซล

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง
- มีเนื้องอกในกระเพาะอาหาร
- กำลังใช้ยาต้านไวรัสชื่อ "เอทาซานาเวียร์"
- ผิวหนังผิดปกติจากยาลับยั้งกรดตัวอื่น
- ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมทารก

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาทั้งเม็ด ไม่เคี้ยว บด หรือทำให้เม็ดยาแตก

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินครั้งต่อไป ไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
- ปรับพฤติกรรมการกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อผลการรักษาที่ดี

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
 - มีภาวะติดเชื้อบ่อย มีไข้สูง เจ็บคอ มีแผลในช่องปากหรือลำคอ
 - เลือดออกผิดปกติ เลือดไหลไม่หยุดเวลามีแผล
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ปวดหัว มึนหัว นอนไม่หลับ
- ไม่สบายท้อง ท้องเสีย ท้องผูก ท้องอืด
- คลื่นไส้ อาเจียน

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก