

นิโคลซาไมด์
ความแรง 60 มิลลิกรัม
ยาเม็ดเคี้ยว

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า นิโคลซาไมด์ (niclosamide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ถ่ายพยาธิตัวแบน เช่น พยาธิตืดวัว พยาธิตืดหมู พยาธิตืดปลา และ พยาธิตืดแคระ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เด็กอายุ 2-12 ปี

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ: กินครั้งละ 4 เม็ด เพียงครั้งเดียวก่อนนอน เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมหันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยานี้ตามคำแนะนำที่ท่านได้รับ
- ควรดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่มี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้สูง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน
- เวียนหัว ปวดหัว รู้สึกบ้านหมุน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 27ก.ย.2019