

วอริโคนาโซล
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า วอริโคนาโซล (voriconazole) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อราชนิดรุนแรง (invasive fungal infection) หรือ ต้องการการรักษาด้วยยาด้านเชื้อราชนิดอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาด้านเชื้อราอื่นในกลุ่มเอโซล เช่น ฟลูโคนาโซล
- หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิดที่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ หรือทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง หากท่านใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นมาก่อนหรือขณะกินยานี้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- โรคหัวใจเต้นผิดปกติ หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
- โรคตับบกพร่อง
- การมองเห็นผิดปกติ
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังอาหาร
- กลืนยาทั้งเม็ดและดื่มน้ำตาม

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ตาแพ้แสง มองเห็นภาพเบลอ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยาอาจทำให้มึนงง และมองเห็นผิดปกติ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- การมองเห็นผิดปกติรุนแรง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- เวียนศีรษะ ปวดหัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร