

อีริโทรไมซิน

125, 200 หรือ 250 มิลลิกรัม

ใน 5 มิลลิลิตร

ชนิดยาผงผสมน้ำก่อนใช้

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอีริโทรไมซิน (erythromycin) มีตัวยา 125, 200 หรือ 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร เป็นยาปฏิชีวนะอยู่ในกลุ่มแมโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียของทางเดินหายใจส่วนต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มแมโครไลด์
- ผู้ที่กำลังใช้ยาซิมวาสแตติน โลวาสแตติน โทเลเทอโรดีน อะมิซัลพรายด์ ดอมเพอริโดน ซิสซาไพรอด ไพโมไซด์ เออร์โกทามีน ไดไฮโดรเออร์โกทามีน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง
- หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- การผสมยาต้องใช้น้ำสุก หรือน้ำสะอาดที่เย็น ห้ามใช้น้ำร้อน
- ก่อนผสมน้ำควรเคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับตัวกัน
- เติมน้ำครั้งแรก ประมาณครึ่งถึงสองในสาม (1/2 - 2/3) ของขีดที่กำหนดข้างขวดยา หรือพอท่วมผงยา
- กึ่งขวดบนฝ่ามือให้ยากระจายตัวทั่วไม่มีก้อนแข็ง
- เติมน้ำให้ถึงขีดที่กำหนดข้างขวดยา กึ่งขวดบนฝ่ามือให้เข้ากันอีกครั้ง
- กินยานี้หลังอาหารทันที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ กินยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือสูญเสียการได้ยินชั่วคราว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ผสมน้ำแล้วเก็บได้ 7 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร