

ไซเมทิโคน

ชนิดยาเม็ดสำหรับเด็ก

40 มิลลิกรัม 80 มิลลิกรัม 100 มิลลิกรัม
120 มิลลิกรัม 125 มิลลิกรัม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไซเมทิโคน (simethicone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ แก้อืดท้องเฟ้อ เนื่องจากมีลมในทางเดินอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- หญิงที่กำลังให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาลีโวไทรอกซินที่ใช้รักษาโรคไทรอยด์ เพราะอาจทำให้ระดับยาลีโวไทรอกซินลดลงและส่งผลต่อการควบคุมโรคไทรอยด์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนและดื่มน้ำตาม 1 แก้ว

3.2 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

การกินยานี้เกินขนาดอาจทำให้ท้องผูก ให้แก้ไขด้วยการดื่มน้ำมาก ๆ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าใช้ยานี้มากกว่า 14 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผื่นคันบริเวณผิวหนัง
- ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**