

ฟอสโฟไมซิน
ความแรง 2 กรัม
ชนิดผงละลายสำหรับฉีด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าฟอสโฟไมซินโซเดียม (fosfomycin sodium) มีตัวยา 2 กรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- โรคกระดุกอักเสบ (เป็นหนอง)
- โรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ
- โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- โรคสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร
- เป็นผู้ป่วยโรคไต
- มีประวัติ ท้องร่วงรุนแรงจากการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
- เป็นผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณเกลือโซเดียม **เพราะยานี้มีส่วนประกอบของโซเดียม**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาฉีดเกินขนาดให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการหกล้ม หรือพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้มึนงงได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนแรง มีไข้ เลือดออกง่าย
- การมองเห็นผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็ว
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ปวดท้อง ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีไข้ **“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดท้อง มีอาการคลื่นเหียน อยากจะอาเจียน **“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน