

ซัลทามิซิลลิน

ขนาด 1.5 กรัม

ยาผงปราศจากเชื้อสำหรับ
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ซัลทามิซิลลิน(sultamicillin) มีตัวยา แอมพิซิลลิน (ampicillin) 1 กรัม และ ซัลแบ็กแทม (sulbactam) 0.5 กรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม เพนิซิลลิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อโรคปอดอักเสบ, ตับ, ภายในช่องท้อง, อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง, ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน หรือใช้ป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาเพนิซิลลิน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- หญิงอยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- กำลังเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโมโนนิวคลีโอสิส (มีไขเจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมฉีด ยาควรทำอย่างไร

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน

3.3 ถ้า ฉีด ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาฉีดเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระวังระวังการหกล้ม หรือพลัดตกจากที่สูง เพราะ ยานี้ทำให้มีมึนงงได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกด
 - ท้องเสีย ชับถ่ายเป็นน้ำและมีมูกหรือเลือดปน
 - ดีซ่าน ตาเหลือง ตัวเหลือง
 - ชีต อ่อนเพลีย ใจสั่น หน้ามืด วิงเวียน
- “หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- ปวด บวมแดง บริเวณที่ฉีด
 - คลื่นไส้ อาเจียน
 - ปวดบริเวณปาก ลิ้นมีสีคล้ำ
 - ปวดช่องท้อง ท้องอืด ท้องเสีย
 - อ่อนแรง ง่วงนอน มึนงง ปวดหัว ตะคริว
- “ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน