

อะทอร์วาสแททิน 10, 20, 40, 80 มิลลิกรัม รูปแบบรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะทอร์วาสแททิน (atorvastatin) เป็นยาลดไขมันในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อ
 - ลดไขมันในเลือด
 - ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
 - เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
 - ผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
 - ผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคเชื้อราโพซาโคนาโซล เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงต่อกล้ามเนื้อและไตวายเฉียบพลัน
- แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ดิจอกซิน
 - สมุนไพร
 - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละครั้ง เวลาใดก็ได้ โดยให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาและอันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

- **เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ** คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อน หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กัดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบากหรือ ปัสสาวะออกน้อยลง
 - เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล
 - อาการอ่อนแรง เพลีย อัมพาตชกใจชกหนึ่งของร่างกาย
 - หายใจลำบาก ไอแห้ง น้ำหนักลด อ่อนล้า และมีไข้
- #### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- หลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ผื่นร้าย สับสน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ

22 มีนาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร