

ไนโตรฟูแรนโทอิน ความแรง 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไนโตรฟูแรนโทอิน (nitrofurantoin) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และใช้เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มไนโตรฟูแรน
- หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด รวมถึงอยู่ระหว่างคลอดบุตร
- หญิงให้นมบุตรที่ทารกมีภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี
- ทารกอายุต่ำกว่า 3 เดือน
- ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี
- โรคไต
- โรคพอร์ไฟเรีย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคเบาหวาน
- เป็นโรคโลหิตจาง มีภาวะขาดโพแทสเซียม ซึ่งทำให้ซีดเห็นได้ง่าย
- มีความเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้หลังอาหารทันทีเพื่อลดอาการข้างเคียงและเพิ่มการดูดซึมยาในทางเดินอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะต้อยา
- ยานี้อาจทำให้มีปัสสาวะสีเหลืองจากสีของตัวยา แต่หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงอื่นร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยาอาจทำให้ง่วงนอน และมีมึนงง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ชาปลายมือปลายเท้า
- ซีด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีไข้ มึนงง หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะสีน้ำตาล
- ใช้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย โดยเฉพาะในช่วงแรกของการกินยา

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- เวียนศีรษะ ปวดหัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร