

**บупรอปิออนไฮโดรคลอไรด์
150 มิลลิกรัม, 300 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดรูปแบบปลดปล่อยแบบทยอย
[ชื่อการค้า]**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า บุปรอปิออนไฮโดรคลอไรด์ (bupropion hydrochloride) เป็นยาแก้ซึมเศร้า

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาล
- ใช้รักษาโรคซึมเศร้า
- ช่วยในการเลิกบุหรี่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- ถ้าท่านมีสภาวะดังต่อไปนี้
 - เป็นโรคลมชักหรือเคยมีประวัติชักมาก่อน
 - เป็นโรคเนื้องอกในสมอง
 - เป็นโรคตับแข็ง
 - มีความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอาหาร เช่น เป็นโรคหิวไม่หาย โรคเบื่ออาหารที่มีเหตุจากจิตใจ (anorexia nervosa)
 - เป็นโรคหรือความผิดปกติชนิดไบโพลาร์
 - เพิ่งหยุดใช้ยาคลายกังวล หรือยานอนหลับ หรือยากันชักบางชนิด หรือเพิ่งหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 - กำลังใช้ยาแก้ซึมเศร้าบางชนิด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรใช้อย่างระมัดระวังหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 - ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี)
 - หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
 - ผู้ที่มีภาวะการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง
 - ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
 - ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 - ผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้
 - ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการชัก
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเพิ่มความเสี่ยงในการชักหรือเกิดอันตรายจากยานี้ได้** เช่น
 - ยาจิตเวช เช่น ยาแก้ซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล
 - ยาต้านมาลาเรีย
 - ยาสเตอรอยด์ในรูปแบบกิน
 - ทิออฟิลลีน
 - ทรามาดอล
 - ยาต้านแบคทีเรียในกลุ่มควิโนโลน
 - ยาแก้แพ้บางชนิด
 - ยาด้านชัก เช่น คาร์บามาซีพีน วาลโพรเอต เฟนิทอยน์
 - ยาด้านไวรัส เช่น ริโทนาเวียร์ เอฟาไวเรนซ์
 - ยาด้านอาการพาร์กินสัน เช่น ลีโวโดปา อะแมนตาดีน ออเฟเนดริน
 - ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น โคลพิโดเกรล ไทโคลพิดีน
 - **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเพิ่มความเสี่ยงในการชักหรือเกิดอันตรายจากยานี้ได้**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามไปกินยามื้อถัดไปในเวลาเดิม โดยกินยาในขนาดปกติตามที่แพทย์สั่ง ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- อย่ากินยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- อย่าหยุดกินยานี้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้าหากต้องใช้อื่นร่วมด้วย ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบว่าท่านกำลังกินยานี้อยู่
- ควรกินยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน
- ระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ชัก
- ความดันเลือดสูง
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปากแห้ง
- นอนไม่หลับ
- ปวดหัว เวียนหัว
- น้ำหนักลด
- สิ้น เหงื่อออก
- หดหู่ ประสาทหลอน
- รู้สึกอยากฆ่าตัวตาย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13

ธันวาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร