

แบ็กโคลเฟน
ความแรง 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า แบ็กโคลเฟน (baclofen)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณไขสันหลัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นแผลในกระเพาะอาหาร

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของปอด
- มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ
- เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล
- เป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติการชักผิดปกติ
- เป็นโรคเบาหวาน
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงที่กำลังให้นมทารก

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม

- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาและการรักษาไม่ได้ผล
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัวได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักรหากมีอาการดังกล่าว
- หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เกิดการง่วงซึมที่มากผิดปกติ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่สบายท้อง ระบบขับถ่ายผิดปกติ
- ปากแห้ง คอแห้ง การรับรสผิดปกติ
- ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่สบายตัว กล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติ
- ง่วงซึม มึนงง มองเห็นไม่ชัด
- ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 28 ก.ย. 2019

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**