

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

โทพามาแมกซ์®

ชนิดเม็ดและแคปซูลสปริงเคิล

โทพิราเมท

เอกสารกำกับยาฉบับนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้จะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโทพามาแมกซ์รูปแบบยาเม็ดและแคปซูลสปริงเคิล ในเอกสารกำกับยาจะไม่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ และเอกสารกำกับยาไม่สามารถแทนที่การพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรได้

ยาทุกตัวมีความเสี่ยงและผลดี แพทย์จะเป็นคนพิจารณาระหว่างความเสี่ยงเมื่อคุณได้รับโทพามาแมกซ์ต่อผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาตัวนี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

เก็บเอกสารกำกับยาฉบับนี้ไว้ คุณอาจมีความจำเป็นต้องอ่านมันอีกรอบ

โทพามาแมกซ์ใช้สำหรับอะไร

ยาของคุณมีชื่อว่าโทพามาแมกซ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ โทพิราเมท

โทพามาแมกซ์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาด้านอาการชัก (antiepileptics) โทพามาแมกซ์ใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพื่อรักษาอาการชัก และใช้ในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน แต่ไม่ใช่ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนชนิดเฉียบพลัน

ยาสามารถป้องกันอาการชักและโรคไมเกรนโดยการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสารเคมีในสมอง

แพทย์ของคุณอาจจะทำการส่งจ่ายโทพามาแมกซ์เป็นยาเดี่ยวหรือว่าใช้ร่วมกับยาตัวอื่นสำหรับควบคุมอาการชักของคุณ

แพทย์ของคุณอาจจะทำการส่งจ่ายโทพามาแมกซ์เนื่องด้วยเหตุผลอื่น ๆ โปรดสอบถามแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยถึงเหตุผลในการที่แพทย์ส่งจ่ายยาตัวนี้ให้กับคุณ

ก่อนที่คุณจะใช้โทพามาแมกซ์

เมื่อไรที่ห้ามคุณใช้ยาตัวนี้

ห้ามใช้โทพามาแมกซ์ถ้าคุณมีการแพ้ (ภาวะภูมิไวเกิน) ต่อ:

- โทพิราเมท

- ส่วนผสมอื่น ๆ ดูหัวข้อ คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ส่วนท้ายของเอกสารกำกับยาฉบับนี้ สำหรับรายการส่วนผสมของยา
- ถ้ายาเม็ดหรือยาแคปซูลไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารกำกับยาฉบับนี้

อาการแพ้หรือภาวะภูมิไวเกิน ประกอบด้วย:

- ผื่นผิวหนัง มีอาการคัน หรือผื่นลมพิษบนผิวหนัง
- หายใจหอบ มีเสียงหวีด หรือหายใจลำบาก
- มีอาการบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ห้ามใช้โทพามาแมกซ์ถ้าบรรจุกัมมันตภาพรังสีหรือมีการปลอมแปลง ห้ามใช้โทพามาแมกซ์ภายหลังจากวันหมดอายุที่ได้มีการระบุไว้บนบรรจุกัมมันตภาพรังสี

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยา

คุณต้องแจ้งแพทย์ถ้าคุณ:

- ตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ โทพามาแมกซ์ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์เมื่อมีการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ความปลอดภัยของยาไม่ได้มีการพิสูจน์ยืนยันในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ ข้อมูลที่มีอยู่บ่งบอกว่าคุณมีความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้โทพามาแมกซ์ในมนุษย์ระหว่างการตั้งครรภ์และการพิการตั้งแต่กำเนิด รวมไปถึง โรคปากแหว่งเพดานโหว่ อย่างไรก็ตาม การควบคุมอาการชักของคุณในระหว่างที่คุณกำลังตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โทพามาแมกซ์ แพทย์สามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะมีการใช้ยาหรือไม่ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์
- กำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือต้องการจะให้นมบุตร อาจจะพบโทพามาแมกซ์ในน้ำนมและไม่แนะนำให้ทำการให้นมบุตรในระหว่างที่มีการใช้โทพามาแมกซ์
- มีหรือเคยมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ หรือความเจ็บป่วยทางจิต
- มีหรือเคยมีนิ่วในไต โรคลไต หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติมีนิ่วในไต
- มีหรือเคยมีโรคตับ
- มีปัญหาเกี่ยวกับตา หรือความดันในลูกตาสูง
- มีประวัติภาวะกรดจากเมแทบอลิซึม (metabolic acidosis) (มีกรดในเลือดมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีอัตราการหายใจที่ถี่ขึ้น)

ในกรณีที่พบได้น้อย โทพามาแมกซ์อาจทำให้ระดับของแอมโมเนียสูงในเลือด (พบได้เมื่อตรวจเลือด) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการทำงานของสมอง โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังรับประทานยาชื่อ กรดวาลโพรอิก (valproic acid) หรือโซเดียมวาลโพรอेट (sodium valproate) เนื่องจากสิ่งนี้อาจเป็นภาวะที่

รุนแรงได้ โปรดแจ้งให้แพทย์ของคุณทราบทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น (ดูหัวข้อ 'อาการข้างเคียง' ประกอบ)

- คิด จดจำข้อมูล หรือแก้ไขปัญหายุ่งยาก
- มีความตื่นตัวหรือการรับรู้ลดลง
- รู้สึกง่วงร่วมกับมีพลังงานต่ำ

ที่ขนาดยาโทพามาแมกซ์ที่สูงขึ้นอาจทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้

ถ้าคุณยังไม่ได้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวไว้ด้านบน ให้แจ้งพวกเขาก่อนหน้าที่จะเริ่มใช้โทพามาแมกซ์

แพทย์ของคุณจะให้คำแนะนำกับคุณว่าจะมีการใช้โทพามาแมกซ์หรือไม่ หรือถ้าคุณจำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาหรือปรับเปลี่ยนการรักษา

การใช้ยาตัวอื่น

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรถ้าคุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยปราศจากใบสั่งแพทย์จากร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้:

- ยาตัวอื่นสำหรับรักษาโรคลมชัก เช่น เฟนิทอยน์ (phenytoin) หรือ คาร์บามาซีปีน (carbamazepine)
- ดิจอกซิน (digoxin) (ใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจ)
- ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน (ยาคุม)
- เมตฟอร์มิน (metformin) ไพโอกลิทาโซน (pioglitazone) หรือ ไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide) (ใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวาน)
- ลิเทียม (lithium) หรือ ริสเพอริโดน (risperidone) (ใช้สำหรับรักษาโรคไบโพลาร์และโรคจิตเภท)
- แฮโลเพอริดอล (haloperidol) (ใช้สำหรับรักษาภาวะทางจิต)
- ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (hydrochlorothiazide) (ใช้สำหรับรักษาอาการบวมหรือความดันโลหิตสูง)
- โพรพานอลอล (propranolol) (ใช้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูง โรคหัวใจบางชนิด อาการสั่น ปวดศีรษะจากเนื้องอกหรือปวดศีรษะไมเกรน)
- ดิลไทอาเซม (diltiazem) (ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงและป้องกันอาการปวดแสบหัวใจ)
- กรดวาลโพรอิก (valproic acid) (ใช้สำหรับรักษาโรคลมชักหรือความผิดปกติทางอารมณ์)

- อะมิทริปไทลีน (amitriptyline) (ใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้า)
- ฟลูนาริซีน (flunarizine)
- วอร์ฟาริน (warfarin) และยาอื่นที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มยาต้านวิตามินเค (vitamin K antagonists) (ใช้ป้องกันการแข็งตัวของเลือด)
- ยาตัวใด ๆ ที่ส่งผลทำให้ปฏิกิริยาตอบสนองของคุณช้าลง (ยากดระบบประสาทส่วนกลาง) ซึ่งอาจรวมถึงยาที่ช่วยในการนอนหลับหรือระงับอาการปวด ยาด้านซึมเศร้า ยากล่อมประสาท หรือยาด้านฮิสตามีน ซึ่งสามารถทำให้คุณมีอาการง่วงนอนได้

ยาเหล่านี้ อาจส่งผลต่อโทปาแมกซ์หรืออาจส่งผลต่อการทำงานของโทปาแมกซ์ แพทย์หรือเภสัชกรจะเป็นคนแจ้งคุณว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าคุณกำลังมีการใช้ยาอื่น ๆ เหล่านี้อยู่

ใช้โทปาแมกซ์อย่างไร

ใช้ยาอย่างไร

ทำตามแพทย์แนะนำให้ใช้โทปาแมกซ์เมื่อไรและอย่างไร

คุณสามารถรับประทานยาเม็ดหรือแคปซูลพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ ให้กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำจำนวนมากเสมอ

โทปาแมกซ์แคปซูลสปริงเคิลใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ แคปซูลเหล่านี้สามารถเปิดออกและโรยเม็ดสปริงเคิลทั้งหมดบนช้อนชาที่บรรจุอาหารอ่อนที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการเคี้ยว ควรกลืนยาที่ผสมกับอาหารแล้วทันทีโดยไม่เคี้ยว ไม่สามารถเก็บยาที่ผสมกับอาหารแล้วเพื่อไว้ใช้ในอนาคตได้ ตัวแคปซูลเองสามารถที่จะกลืนได้ทั้งแคปซูลพร้อมกับน้ำได้

ขนาดยาที่แสดงข้างล่างเป็นขนาดยาที่แนะนำทั่วไป อย่างไรก็ตามแพทย์อาจจะให้คุณรับประทานในขนาดยาที่สูงกว่าหรือหรือต่ำกว่านั้นก็ได้ แพทย์จะเริ่มต้นด้วยขนาดยาที่ต่ำก่อนและค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาถึงขนาดยาที่ต่ำที่สุดที่ต้องการเพื่อควบคุมโรคลมชักของคุณ

เมื่อเริ่มต้นการรักษา โทปาแมกซ์อาจให้รับประทานวันละครั้ง โดยเฉพาะเวลากลางคืน หลังจากมีการเพิ่มขนาดยาแล้วจะรับประทานเป็นวันละ 2 ครั้ง

คุณควรใช้โทปาแมกซ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งให้คุณหยุดใช้ยา แนะนำให้ค่อย ๆ ลดขนาดยาลงก่อนที่จะหยุดยา

ผู้ใหญ่

โรคลมชัก (Epilepsy)

การรักษาเริ่มต้นที่ขนาดยาที่ต่ำ คือ 25 ถึง 50 มิลลิกรัมต่อวัน ค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาครั้งละ 25 ถึง 100 มิลลิกรัมทุกสัปดาห์หรือนานกว่านั้น จนกว่าจะถึงขนาดยาที่เหมาะสม

โรคไมเกรน (Migraine)

การรักษาเริ่มต้นที่ขนาดยาที่ต่ำ คือ 25 มิลลิกรัมทุกคืน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพิ่มขนาดยาทุกสัปดาห์หรือนานกว่านั้นโดยเพิ่มครั้งละ 25 มิลลิกรัมต่อวัน จนกว่าจะถึงขนาดยาที่เหมาะสม

เด็ก (อายุตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป) – สำหรับโรคลมชักเท่านั้น

การรักษาเริ่มต้นที่ขนาดยา 25 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่านั้นต่อวัน โดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว ค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาทุกสัปดาห์หรือนานกว่านั้น จนกว่าจะถึงขนาดยาที่เหมาะสม

ถ้าคุณลืมรับประทานยา

- รับประทานยาทันทีที่นึกได้และรับประทานยามื้อถัดไปในเวลาปกติ
- ถ้าเกือบจะถึงยามื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อนั้นไปและรับประทานยามื้อถัดไปเมื่อคุณตั้งใจ
- ห้ามรับประทานยาในขนาดที่เพิ่มเป็น 2 เท่าจากขนาดปกติเพื่อชดเชยมื้อที่คุณลืมรับประทาน

ถ้าคุณลืมรับประทานยามากกว่า 1 มื้อ หรือไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร ให้ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าคุณมีปัญหาด้านการจำว่าต้องรับประทานยาเมื่อไร ให้สอบถามเภสัชกรถึงเทคนิคในการจำ

ถ้าคุณรับประทานยามากเกินไป (ได้รับยาเกินขนาด)

ให้รีบโทรติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาโดยทันทีเพื่อขอคำแนะนำ หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด

ให้ทำอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแม้ว่าจะไม่มีอาการแสดงของความไม่สบายหรือการเกิดพิษ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ถ้าคุณรับประทานโทพามาแอกซ์มากเกินไป คุณอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม ง่วงซึม มีอาการชัก มีอาการผิดปกติในการพูด มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอ มีความลำบากในการคิด การประสานงานไม่ปกติ ปวดท้อง ซึมเศร้า กระสับกระส่าย หายใจเร็ว หรือคุณอาจจะหมดสติ

ในระหว่างที่คุณกำลังใช้โทพามาแอกซ์

สิ่งที่คุณต้องทำ

- ดื่มน้ำจำนวนมาก เป็นที่ทราบกันว่าโทพามาแอกซ์ส่งผลให้เกิดนิ่วในไต และการดื่มน้ำอาจช่วยในการป้องกันได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างรอบคอบเสมอ

- ถ้าคุณจะมีการเริ่มมีการใช้ยาตัวใหม่ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรว่าคุณกำลังรับประทานโทพามาแมกซ์อยู่
- แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้โทพามาแมกซ์อยู่

สิ่งที่คุณห้ามทำ

- ห้ามหยุดโทพามาแมกซ์เองทันทีโดยที่ไม่ได้มีการตรวจกับแพทย์
- ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
- ห้ามขับขีหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะทราบว่ายาส่งผลอย่างไรกับคุณ
- ห้ามใช้โทพามาแมกซ์เพื่อรักษาโรคอื่นนอกจากแพทย์จะเป็นคนสั่งให้ใช้
- ห้ามให้ยานี้กับคนอื่นเพื่อนำไปใช้

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

การปรับเปลี่ยนยาของคุณ

ถ้าคุณไม่มีอาการชักหรือมีการควบคุมอาการชักอย่างดี จะมีการลดขนาดยาของคุณลง การหยุดหรือแทนที่ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะต้องถูกประเมินโดยแพทย์และเภสัชกรก่อน และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรค่อย ๆ ดำเนินการ

ผลต่อการคิดหรือพฤติกรรม

ยาที่ใช้รักษาโรคลมชักสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการคิดหรือการกระทำการฆ่าตัวตายได้ ถ้าคุณประสบกับความรู้สึกเศร้ามากและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า (ซึมเศร้า) หรือการที่มีความรู้สึกเหล่านี้ที่แย่งกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากปกติหรือเกิดความคิดฆ่าตัวตายกระทันหัน หรือ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง คุณควรรีบรายงานสิ่งเหล่านี้กับแพทย์ของคุณโดยทันที

การเห็งื่ออกลดลงและอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มสูงขึ้น

โทพามาแมกซ์อาจส่งผลให้เห็งื่ออกลดลงและอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มสูงขึ้น (มีไข้) ในคนไข้ โดยเฉพาะในเด็ก ควรมีการเฝ้าดูอาการแสดงของการเห็งื่ออกลดลงและมีไข้ โดยเฉพาะในอุณหภูมิที่สูง บางคนอาจจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการ ให้รีบโทรศัพท์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการไข้สูง และไข้ไม่ลดลง หรือเห็งื่ออกลดลง

ผลต่อการขับขีและการใช้เครื่องจักร

โทพามาแมกซ์อาจส่งผลให้มีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ และอาการอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการขับขีหรือการใช้เครื่องจักร ยาอาจส่งผลกระทบต่อความผิดปกติด้านการมองเห็น และหรือ ทำให้มองเห็นภาพเบลอ ให้แน่ใจว่าคุณทราบว่ายานี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณก่อนที่คุณจะขับขีหรือใช้เครื่องจักร แนะนำให้มีการดูแลเป็นพิเศษเมื่อคุณเพิ่งเริ่มใช้โทพามาแมกซ์หรือถ้ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณโทพามาแมกซ์หรือยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังมีการใช้อยู่

ผลของอาหารและแอลกอฮอล์

โทพามาแมกซ์สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้
ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้โทพามาแมกซ์ แอลกอฮอล์อาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์
เช่น อาการง่วงซึม

อาการข้างเคียง

ยาทุกตัวสามารถเกิดอาการข้างเคียงได้ ในบางครั้งอาการข้างเคียงจะมีความรุนแรง แต่ส่วนใหญ่แล้ว
อาการที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไร คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ถ้าคุณเกิดอาการ
ข้างเคียงขึ้น โปรดอย่าตื่นตระหนกกับรายการของอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณอาจจะไม่เกิด
อาการเหล่านี้ขึ้นก็ได้

ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรในข้อสงสัยที่คุณมี

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือทำให้คุณกังวล:

- เวียนศีรษะ
- ความอยากอาหารลดลงหรือน้ำหนักตัวลดลง
- มีอาการคันที่ผิวหนังหรือผื่นผิวหนัง
- ไม่สามารถนอนหลับได้
- มีความรู้สึกเหน็บและชาที่มือและเท้า (อาการเหน็บชา)
- คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน หรือท้องผูก
- ปวดหรือไม่สบายท้อง
- ปวดหู มีเสียงหึ่งหรือกริ่งในหู หูหนวก

**แจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เพราะคุณอาจจำเป็นต้องได้รับดูแล
ทางการแพทย์:**

- ซึมเศร้า
- มีอาการทางประสาท หรือรู้สึกกระวนกระวาย
- มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ก้าวร้าว กระสับกระส่าย หรือมีอารมณ์โกรธ
- ไม่มีสมาธิ
- มีความลำบากในการจำหรือมีความผิดปกติของความจำ
- กระบวนการคิดช้าลง
- พฤติกรรมผิดปกติ
- มีความผิดปกติในการใช้ภาษา

- มีความลำบากในการพูด
- มีความผิดปกติด้านการทรงตัว
- มีปัญหาด้านการประสานงาน
- ผมร่วงผิดปกติหรือผมบางขึ้น
- ความถี่ในการปัสสาวะผิดปกติ
- ความรู้สึกหรือความไวลดลง โดยเฉพาะ ในผิวหนัง
- มีไข้หรืออุณหภูมิสูง
- เหงื่อออกลดลงหรือสูญเสียการขับเหงื่อ หรือมีความร้อนสูงเกินไป (โดยส่วนใหญ่ในเด็ก)
- มีอาการอ่อนแรงที่ผิดปกติ
- มีการรับรสที่ผิดปกติหรือสูญเสียการรับรส

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้:

- เหนื่อยผิดปกติ ง่วงซึม หงุดหงิดหรือขาดพลังงาน
- หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ หรือมีอาการแน่นที่ทรวงอก
- มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- มีน้ำในไต
- มีอาการปวดในขณะที่กำลังปัสสาวะ
- มีการมองเห็นที่เปลี่ยนไปแบบทันทีทันใด (เช่น มองเห็นภาพเบลอ มองเห็นภาพซ้อนหรือสูญเสียการมองเห็น) หรือเกิดการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาได้อย่างรวดเร็ว
- ปวดตาหรือความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น
- มีภาวะเลือดออกโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้หรือเลือดออกบ่อยขึ้น
- มีอาการตุ่มพองและเลือดออกที่บริเวณเยื่อเมือกอย่างรุนแรง (เช่น ริมฝีปาก ตา ปาก จมูก อวัยวะเพศ)
- คิด จดจำข้อมูล หรือแก้ไขปัญหาได้ยาก มีความตื่นตัวหรือการรับรู้ลดลง รู้สึกง่วงร่วมกับมีพลังงานต่ำ – อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของการมีระดับแอมโมเนียสูงในเลือด (hyperammonemia) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง (hyperammonemic encephalopathy) ได้

สิ่งเหล่านี้คืออาการข้างเคียงที่รุนแรง คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน อาการข้างเคียงที่รุนแรงสามารถพบได้น้อย

อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการด้านบนอาจเกิดขึ้นได้ในคนบางคน แจ้งแพทย์ถ้าคุณสังเกตเห็นอาการข้างเคียงอื่น ๆ

หลังจากใช้โทพามาแมกซ์

การเก็บยา

- เก็บโทพามาแมกซ์ชนิดเม็ดหรือแคปซูลในบรรจุภัณฑ์เดิมจนกว่าจะถึงเวลาใช้ยา
- เก็บโทพามาแมกซ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- สำหรับโทพามาแมกซ์ชนิดแคปซูลสปริงเคิล เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้น ห้ามเก็บยาที่ได้ผสมกับอาหารแล้ว
- ห้ามเก็บโทพามาแมกซ์หรือยาใด ๆ ในห้องน้ำหรือใกล้อ่างล้างมือ/อ่างล้างจาน ห้ามเก็บยาไว้ในรถยนต์หรือวางไว้บนธรณีหน้าต่าง ความร้อนและความชื้นสามารถทำลายยาบางตัวได้
- เก็บโทพามาแมกซ์ในที่ที่เด็กไม่สามารถหยิบจับได้ ตู้ที่สามารถล็อกได้ที่มีความสูงอย่างน้อย 1 เมตรครึ่ง (1.5 เมตร) จากพื้นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บยา

การกำจัดยา

- ถ้าแพทย์สั่งให้คุณหยุดโทพามาแมกซ์หรือยาของคุณเลยวันหมดอายุแล้ว ให้สอบถามเภสัชกรว่าต้องทำอย่างไรกับยาเม็ดหรือแคปซูลที่เหลืออยู่

คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ยามีลักษณะเป็นอย่างไร

ยาเม็ด

โทพามาแมกซ์ชนิดเม็ดจะบรรจุในขวด ขวดละ 60 เม็ด พร้อมซองกันชื้น หรือบรรจุในแผงบลิสเตอร์ (อะลูมิเนียม/อะลูมิเนียม) แผงละ 60 เม็ด:

- ยาเม็ดขนาด 25 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลม สีขาว มีตัวอักษร “TOP” บนด้านหนึ่ง และตัวเลข “25” บนอีกด้านหนึ่ง
- ยาเม็ดขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลม สีเหลืองอ่อน มีตัวอักษร “TOP” บนด้านหนึ่ง และตัวเลข “50” บนอีกด้านหนึ่ง
- ยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลม สีเหลือง มีตัวอักษร “TOP” บนด้านหนึ่ง และตัวเลข “100” บนอีกด้านหนึ่ง

ยาแคปซูล

โทพามาแมกซ์ชนิดแคปซูลสปริงเคิลจะบรรจุในขวด ขวดละ 20, 28, 50, 60 หรือ 100 แคปซูล แคปซูลจะประกอบด้วยปลอกลักษณะใสและตัวแคปซูลสีขาว ภายในบรรจุเม็ดกลมขนาดเล็กสีขาวถึงสีขาวนวล

- ยาแคปซูลขนาด 25 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “TOP” บนปลอก และตัวเลข “25 mg” บนตัวแคปซูล
- ยาแคปซูลขนาด 50 มิลลิกรัม มีตัวอักษร “TOP” บนปลอก และตัวเลข “50 mg” บนตัวแคปซูล

ส่วนประกอบของยา

ยาเม็ด

- ประกอบด้วยตัวยาสำคัญโทพิราเมท 25, 50 หรือ 100 มิลลิกรัมต่อเม็ด
- ในยาเม็ดยังประกอบด้วย lactose monohydrate, pregelatinized starch, carnauba wax, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, titanium dioxide, hypromellose, polyethylene glycol และ polysorbate นอกจากนี้ โทพาแมกซ์ชนิดเม็ดขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม ประกอบด้วย synthetic iron oxides

ยาแคปซูล

- ประกอบด้วยตัวยาสำคัญโทพิราเมท 25 หรือ 50 มิลลิกรัมต่อแคปซูล
- ในแคปซูลประกอบด้วย sugar spheres, povidone และ cellulose acetate บรรจุในแคปซูลเจลาติน
- ส่วนเปลือกของแคปซูลประกอบด้วย gelatin, sodium lauryl sulfate, sorbitan monolaurate และ titanium dioxide (สำหรับตัวแคปซูลทึบ สีขาว) และพิมพ์ตัวหนังสือด้วยหมึกสีดำ

เอกสารกำกับยาฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561

ผลิตโดย

ยาเม็ด

Cilag AG, Schaffhausen, Switzerland (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

ยาแคปซูล

Janssen-Ortho LLC, Gurabo, Puerto Rico, USA (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

เลขทะเบียนตำรับยาและวันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

ผลิตภัณฑ์ยา	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
TOPAMAX [®] (25 MG)	1C 210/41 (N)	4 มกราคม 2543
TOPAMAX [®] (50 MG)	1C 211/41 (N)	4 มกราคม 2543
TOPAMAX [®] (100 MG)	1C 212/41 (N)	4 มกราคม 2543
TOPAMAX [®] SPRINKLE CAPSULES (25 MG)	1C 15003/60 (N)	3 มกราคม 2561
TOPAMAX [®] SPRINKLE CAPSULES (50 MG)	1C 15002/60 (N)	3 มกราคม 2561

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200
โทรสาร: 02-792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน

- 1) ยานี้อาจทำให้วงซีม จึงไม่ควรขับชียานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะชียานี้
- 2) ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
- 3) ห้ามชียานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
- 4) ควรระมัดระวังการชียานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
- 5) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเฉียบพลัน (acute myopia) และโรคต้อหินชนิด secondary angle closure glaucoma
- 6) หากชียานี้แล้วมีอาการผิดปกติทางสายตา ได้แก่ มองเห็นไม่ชัดหรือปวดตา ให้หยุดชียานทันทีและปรึกษาแพทย์
- 7) ควรดื่มน้ำให้มากเพียงพอทุกวัน เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไต