

โพซาโคนาโซล
ความแรง 100 mg
ชนิดเม็ดเคลือบทนกรด
ในกระเพาะอาหาร

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า โพซาโคนาโซล เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคติดเชื้อราที่ไม่ได้ผลหลังจากการใช้ยาอื่นมาอย่างน้อย 7 วัน
- ยานี้ใช้เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - กำลังใช้ยาลดไขมันกลุ่ม“สแตติน” เช่น ซิมวาสแตติน โรซิวาสแตติน
 - กำลังใช้ยาบางชนิดรักษาวัณโรค เอชไอวี ลมชัก ไมเกรน มาลาเรีย ใจเต้นผิดปกติ หงุดหงิด เป็นต้น
- “โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านใช้ยาอื่นอยู่”**

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” ตัวอื่นอยู่
- แพ้ยาต้านเชื้อราอื่นในกลุ่มเอโซล เช่น ฟลูโคนาโซล คีโทโคนาโซล อีทราโคนาโซล เป็นต้น
- กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
- อาเจียนหรือท้องเสียที่รุนแรงในช่วงนี้
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- มีภาวะหัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ หรือมีโรคหัวใจ
- มีระดับเกลือแร่ (เช่น โพแทสเซียม) ในเลือดผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาในช่วงเวลาเดิมทุกวัน
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายเม็ดยาก่อนกิน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง
- กินยานี้จนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ควรคุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ เพราะยาอาจส่งผลต่อทารก
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจส่งผลให้หิว หรือมองเห็นผิดปกติได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
- อาเจียนหรือท้องเสียอย่างรุนแรง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผิวหนังผิดปกติ เช่น คัน มีผื่น ผิวแห้ง แสบร้อน
- เวียนศีรษะ ปวดหัว
- ลื่นรับรสอาหารผิดปกติ
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง หรือท้องผูก ไม่อยากอาหาร
- รู้สึกไม่สบายหรืออึดอัดที่ช่องทวารหนัก
- มีไข้เล็กน้อย ไม่สบายตัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา **แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่ให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก