

ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาแก้แพ้ มีชื่อสามัญว่า ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์ (cetirizine hydrochloride)
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น
 - น้ำมูกไหล ตาแดง คันตา คันจมูก คันคอ จาม ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง
 - ไข้เพื่อบรรเทาทางผิวหนัง เช่น คัน ผื่นลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือยาไฮดรอกซีซีน (hydroxyzine) หรือ ส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- มีการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
 - โรคลมชัก
 - ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะคั่ง
 - โรคไต

• แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

• ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น

- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ยานอนหลับหรือยาคลายกังวล
- ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด (เช่น ริโทนาเวียร์)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรอย่างเคร่งครัด

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- หน้ามืด เป็นลม
- ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระมีสีซีดลง
- เหนื่อย หรืออ่อนเพลียรุนแรง
- ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
- สับสน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ชัก
- การมองเห็น หรือการได้ยินผิดปกติ
- ความดันเลือดสูง
- ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที เช่น

- ง่วงซึม นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง
- เวียนหัว ปวดหัว
- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย
- ผิวหนังไวต่อแสง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 เมษายน 2561

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร