

**คลาริโทรไมซิน 250 มิลลิกรัม
และ 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
และ 500 มิลลิกรัม
คลาริโทรไมซิน เอ็มอาร์
[ชื่อการค้า]**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า คลาริโทรไมซิน (clarithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มแมคโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น
 - การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม
 - การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ คอหอยอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ
 - การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น การอักเสบที่ต่อมขี้ไคลเหลือง เชลล์อักเสบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไลด์หรือแพ้ส่วนประกอบในยานี้
- หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตับชั้นรุนแรงหรือไตทำงานไม่ดี
- หากท่านกินยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนที่มีเออร์โกทามีนเป็นส่วนประกอบ
- หากท่านกินยาลดไขมัน ได้แก่ ซิมวาสแตติน โลวาสแตติน
- หากท่านกินยา มิดาโซแลม

- หากท่านกินยา คอลชิซิน เพื่อรักษาโรคเกาต์
- หากท่านเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - โรคไต
 - โรคตับ
 - โรคหัวใจ
 - โรคเบาหวาน
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** ขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบสนองต่อการรักษา
- ยานี้ใช้สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
- กินยาเม็ดในขณะท้องว่าง คือกินยา 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้กินยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม กดเจ็บที่ท้อง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- นอนไม่หลับ
- ปวดศีรษะ
- การรับรสเปลี่ยนไป
- อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
- มีฝ้าขาวในปาก และคอ
- ค้นช่องคลอด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
19 มิถุนายน 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร