

คลอพิโดเกรล
75 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ข้อควรคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า คลอพิโดเกรลไบซัลเฟต (clopidogrel bisulfate) เป็นยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันก่อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดในโรคหัวใจชนิดต่างๆและโรคหลอดเลือดสมอง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีการเลือดออก เช่น แผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือ เลือดออกในอวัยวะภายใน
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - หญิงให้นมบุตร
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิด

อันตรายได้ เช่น ยาลับยั้งการหลังกรด (โอเมพราโซล • เอสโอเมพราโซล)

- การใช้ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกมากขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด • ยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดชนิดอื่น เช่น วาร์ฟาริน เฮพาริน แอสไพริน **จึงต้องใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติ เกิดจ้ำเลือด ควรรีบไปพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

- แจ้งแพทย์และทันตแพทย์ก่อนทำหัตถการ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นและเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดกำเดาไหลหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง ปวดศีรษะ
- ท้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

13 ธันวาคม 2559

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อหากมีปัญหาให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**