

เซฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ความแรง 100 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เซฟดิเนียร์ (cefdinir) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น หลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ปอดอักเสบ ไชนัสอักเสบ คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเซฟาโลสปอริน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเพนิซิลิน
- รมัตรีงการใชยานี้ในหญิงมีครรภ์
- มีอาการลำไส้อักเสบ เช่น ท้องเสีย เป็นต้น
- มีภาวะการทำงานของไตผิดปกติ
- มีภาวะของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดีดยา
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องตรวจเลือดหรือปัสสาวะ เพราะยานี้อาจรบกวนผลการตรวจเลือดและปัสสาวะบางชนิด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียรุนแรง มีมูกเลือดปน โดยอาจมีไข้ร่วมด้วย
- ภาวะตับอักเสบ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้
- เชื้อราในช่องคลอด (เช่น คันช่องคลอด หรือมีตกขาวปริมาณมาก)

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร