

ไดเอทิลคาร์บามาซีน
300 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไดเอทิลคาร์บามาซีน (Diethylcarbamazine citrate) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าพยาธิ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อใช้เพื่อรักษาโรคเท้าช้าง หรือโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิดฟิลาเรีย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เคยเกิดการชัก
- ไตทำงานผิดปกติ
- หัวใจทำงานผิดปกติ
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย หากไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้หลังอาหารทันที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของ แพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ภาวะชัก เสรบรุนแรงที่มีอาการปวดหัว อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปัสสาวะมีเลือดปน ติดต่อกันเกิน 3 วัน

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาการปวดและอักเสบเฉพาะที่ เกิดก่อนกดเจ็บ หรือ ฤงอันตรายบวม ส่วนใหญ่มักหายได้เอง สามารถบรรเทาโดยการให้ยาแก้ปวด ประคบเย็นและพักผ่อน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

<ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2561