

**ด็อกซีไซคลิน**  
**ความแรง 100 มิลลิกรัม**  
**ยาแคปซูล**

**1. ยานี้คือยาอะไร**

**1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อว่า ด็อกซีไซคลินไฮคลาต (doxycycline hyclate) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

**1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น หลอดลมอักเสบ บวมไซนัสอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ สิว หนองใน ซิฟิลิส

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือกลุ่มยาเตตราไซคลิน
- หญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- หญิงให้นมบุตร
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

**2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ต้องสัมผัสแสงแดดจัด
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- โรคทางพันธุกรรมพอร์ฟีเรีย
- เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเอสแอลอี
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น นม ยาลดกรด แอลกอฮอล์

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1. ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้หลังอาหารทันที
- หลังจากกินยานี้ อย่าเอนตัวลงนอนในทันที ควรนั่งตัวตรงอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลดการระคายเคืองจากยาที่มีต่อหลอดอาหาร

**3.2. หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

**4.1. ข้อควรปฏิบัติขณะใช้ยานี้**

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หากมีอาการมองเห็นไม่ชัดในระหว่างที่กินยานี้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ผิวหนังไวต่อแสง โดยอาจเกิดผื่น คัน แดงหรือผิวหนังใหม่ เมื่อสัมผัสแสงแดดจัด
- ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ตามัว มองเห็นภาพซ้อน สูญเสียการมองเห็น
- ลึบบวม ถ่ายเป็นน้ำหรือมูกเลือด

- ปวดข้อ หรือกล้ามเนื้อ
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หดสติ
- เหนื่อย อ่อนเพลีย
- ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง
- ฟันมีสีผิดปกติ
- มีเสียงดังในหู
- เจ็บและคันบริเวณทวารหนัก และ/หรืออวัยวะเพศ

**5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- เจ็บปาก อาหารไม่ย่อย และคลื่นไส้มาก
- รู้สึกไม่สบาย ท้องเสีย
- เบื่ออาหาร

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

<ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 สิงหาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**