

**เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
ไฮโดรโบรไมด์
15 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดและแคปซูล
30 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด**

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เดกซ์โทรเมทอร์แฟนไฮโดรโบรไมด์ (dextromethorphan hydrobromide) อยู่ในกลุ่มยาระงับอาการไอ
- ใช้ระงับอาการไอแบบไม่มีเสมหะ ที่มีสาเหตุจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ หรือ การสูดสิ่งทำให้เกิดระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในยานี้
- ใช้ยาด้านซึมเศร้าบางชนิดใน 14 วันที่ผ่านมา ท่านจึงควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบที่ท่านใช้ยาอะไรอยู่บ้าง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
 - โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคตับ

- ระมัดระวังการใช้ยานี้ใน เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี หรือสตรีให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
- นอกจากนี้ยังมียาหลายชนิดที่หากใช้ร่วมกับยานี้อาจเป็นอันตรายต่อตัวท่าน หากผู้จ่ายยาไม่ทราบว่าท่านกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยาแก้ปวด ยาจิตเวช ยารักษาโรคอ้วน ยานอนหลับ ยาต้านเชื้อรา แอลกอฮอล์ ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ยาต้านไวรัส ยาต้านมาลาเรีย และยารักษาโรคพาร์กินสัน
- การใช้ยานี้ร่วมกับการสูบบุหรี่อาจทำให้ยากในการกำจัดเสมหะ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ยานี้สามารถกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง

- ไม่ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอะไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมือถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอะไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ได้แก่ อาการชัก เคลื่อนไหวแล้วมีอาการสั่น หรือลักษณะการเดินไม่สม่ำเสมอ หายใจช้าหรือลำบาก ตาพร่า ปัสสาวะลำบาก ง่วงซึม เวียนศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียนรุนแรง อาการคลื่น ภาวะตื่นเต้นอย่างไม่เหมาะสมหรือเกินไป กระสับกระส่าย หงุดหงิดมาก

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรทำที่ยานยนต์ หรือ ทำหน้า 1/2 เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะกินยานี้

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ความคิดสับสน อาการคลุ้มคลั่ง กระสับกระส่าย หงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง การพูดไม่ค่อยชัด ชัก เคลื่อนไหวแล้วมีอาการสั่น หายใจช้าหรือลำบาก ตาพร่า ปัสสาวะลำบาก หมดสติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- เวียนศีรษะ ง่วงซึม เหนื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นผิวหนัง ปวดท้อง ท้องผูก ปวดศีรษะ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หน้า 2/2

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสง โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

14 เมษายน 2561