

โดเมนไฮดริเนต 50 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- โดเมนไฮดริเนต (dimenhydrinate) เป็นยาต้านการแพ้ที่มีฤทธิ์ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
- ใช้ป้องกันการเกิดคลื่นไส้อาเจียน และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกี่ยวข้องกับการเมาเรือ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- แพ้ยานี้ หรือแพ้ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้น ได้แก่
 - เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมลูก เด็ก และผู้สูงอายุ
 - ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด ตับทำงานผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ
 - ผู้ป่วยโรคต่อหิน ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะปวดหรือขัด ล้าใ้สุดต้น
 - ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด ฤงลมโป่งพอง ชัก
- ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่
 - เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
- **ไม่ควร** ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยานี้ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม
- ยาอีกหลายชนิดที่หากใช้ร่วมกับยานี้อาจเป็นอันตรายต่อตัวท่าน หากผู้จ่ายยาไม่ทราบว่าท่านกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ เช่น ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ขนาดยาโดเมนไฮดริเนตในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ให้ใช้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
- ถ้ากินยาเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือวิงเวียนจากการเมาเรือ เมาเรือ ให้กินยาก่อนออกเดินทางอย่างน้อยครึ่ง ถึงหนึ่งชั่วโมง
- กินยาตามขนาดยาที่แพทย์สั่ง **ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง**

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ม่านตาขยาย หน้าแดง มีไข้ ประสาทหลอน อ่อนเพลีย ตัวสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปากจุกหรือคอแห้งอย่างรุนแรง ง่วงซึมรุนแรง หมดความรู้สึก หายใจลำบาก และชัก สำหรับเด็กอาจมีเริ่มด้วยอาการตื่นเต้น นอนไม่หลับ และตามด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ประสานกัน ง่วงซึม หมดความรู้สึก และชัก ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาได้ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึมหรือวิงเวียนระหว่างใช้ยานี้ อย่าขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักรกล ยานี้อาจทำให้ปาก จมูก คอแห้ง และเสมหะเหนียวข้นได้ อาจดื่มน้ำมาก ๆ

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หายใจลำบาก หายใจมีเสียงดังหวีด แน่นหน้าอก บวม บริเวณใบหน้า ผื่นแดง ถ่ายปัสสาวะไม่ออก ชัก สับสน
- ตาพร่า หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หรือเต้นเร็ว ตื่นตก ๆ ใจสั่น หรือเจ็บหน้าอก คือ มีเสียงดังในหู พุดไม่มีเสียง รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียอย่างมาก รวมทั้งอาการอื่นใดที่รุนแรงหรือที่ไม่ยอมหายไป

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ง่วงนอน เวียนหัว ปวดหัว คลื่นไส้ หรืออาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง หรือ ท้องผูก ปากแห้ง คอแห้ง เสมหะข้น เมื่ออาหาร แต่บางคนอาจอยากอาหารมากขึ้น น้ำหนักขึ้น อ่อนเพลีย หรือเหนื่อยอ่อน ในเด็กอาจมีอาการกระวนกระวายอยู่ไม่สุข และนอนไม่หลับ ยกเว้นถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

