

ดอมเพอริโดน 10 มิลลิกรัม ชนิดยาเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร มีชื่อสามัญว่า ดอมเพอริโดน
- ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอาหารไม่ย่อย และกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ
- ห้ามใช้ร่วมกับยาด้านเชื้อราคิโตโคนาโซล (ketoconazole) ยาปฏิชีวนะอีริโทรไมซิน (erythromycin) และยาอื่นๆ อีกหลายชนิด เพราะอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- มีโรคของทางเดินอาหารบางชนิดเช่น มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทะลุ เพราะทำให้อาการของโรคเลวลง
- หากท่านเป็นโรคตับโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ดอมเพอริโดน

2.2 ข้อควรระวัง

- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ถ้าท่านเป็นโรคไต โรคหัวใจ แพ้น้ำตาลแลคโทส กำลังให้นมบุตร หรือมีภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในกระแสเลือด
- ก่อนใช้ยานี้โปรดแจ้งแพทย์และเภสัชกรให้ทราบเสมอว่าท่านกำลังใช้ยาใดอยู่ เพราะการใช้ร่วมกับยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อหัวใจได้
- อย่าใช้ยานี้กับเด็กเล็กโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้

- อย่าใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อหัวใจ
- อย่าใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง เพราะเป็นอันตรายต่อหัวใจ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง
- ไม่ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม สับสน ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น การกะพริบหรือขยับตา การแลบลิ้นหรือตัวดิ้น (โดยเฉพาะในเด็ก) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท เพราะอาจเสริมฤทธิ์ให้มีอาการง่วงซึมมากขึ้น

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา ซึ่งอาจมีอาการบวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- เกิดความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น บัสสาวะไม่ออก กะพริบตา แลบลิ้น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุก ซึ่งอาจจะพบในทารกหรือเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ
- รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจเต้นช้าลงมาก ซึ่งอาจทำให้ความดันเลือดตก หหมดสติ และช็อคได้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มีอาการน่านมไหลในผู้ชาย หรือในผู้หญิงแม้ไม่ได้อยู่ในระยะให้นมบุตร
- เต้านมโตขึ้นในเพศชาย
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือไม่มาเลย
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย
- ปากแห้ง เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงซึม

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559