

ซัลฟาเมทอกซาโซล และ ไทรเมโทพริม
ความแรง 400 และ 80 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Bactrim (แบคทริม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซัลฟาเมทอกซาโซล (sulfamethoxazole) 400 มิลลิกรัม และ ไทรเมโทพริม (trimethoprim) 80 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มซัลฟา หรือ ซัลโฟนาไมด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ยังไม่
ดื้อต่อยานี้เท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ หรือ ไทรเมโทพริม
- เคยแพ้ยาขับปัสสาวะหรือยาลดความดันโลหิตในกลุ่มไทอะไซด์
- อายุต่ำกว่า 2 เดือน
- ผู้เป็นโรคตับ หรือโรคไตอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
- ผู้สูงอายุ
- มีอาการของโรคภูมิแพ้หรือโรคหืดอย่างรุนแรง
- เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดกรดโฟลิก
- เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือดที่เรียกว่า พอร์ฟีเรีย

- มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งมีจุดเลือดออกหรือมีแผลฟกช้ำได้ง่าย
- มีภาวะผิดปกติที่มีสารที่เรียกว่าฟีนิลคีนโตนออกมาในปัสสาวะ
- มีประวัติโรคดีซ่าน มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
- มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
- มีภาวะพร่องหรือขาดเอนไซม์จีชีกพีดี
- น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือมีภาวะขาดอาหาร
- การใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นหลายชนิดอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ไซโโดวีน ไซโคลสโพลิน ไรแฟมพิซิน ไทอะไซด์ เมโทเทร็กเซต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้พร้อมอาหารและดื่มน้ำตามมาก ๆ เพื่อลดอาการข้างเคียงของยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ระหว่างที่กินยานี้ ควรดื่มน้ำมาก ๆ ในระหว่างวัน
- ยานี้ทำให้ผิวไวต่อแสง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้แสงแดดเป็นเวลานานและควรสวมเสื้อแขนยาว ใช้ครีมกันแดดและสวมแว่นตากันแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
- หัวใจเต้นผิดปกติหวัะ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก