

## เอนาลาพริล 5, 10, 20 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า เอนาลาพริลมาลีเอต (enalapril maleate) เป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ควบคุมความดันเลือด
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่ม ACE inhibitors
- หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ โรคไต หรือโรคไตที่ต้องฟอกเลือด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับและโรคหลอดเลือดสมองควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
- หากมีอาการอาเจียน ท้องเสียรุนแรง หรืออยู่ระหว่างการควบคุมเกลือในอาหารอย่างเคร่งครัด ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาขับปัสสาวะบางชนิด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ลิเทียม ยาคุมกำเนิด ยาคีโตอินซูลิน ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรด เป็นต้น
- หญิงให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้ให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาในเด็กตามน้ำหนักตัว หรือตามแพทย์สั่ง

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 เมษายน 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร