

นอร์อิทิสเทอโรน
ความแรง 5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า นอร์อิทิสเทอโรน (Norethisterone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาอาการเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
- ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายก่อนมีประจำเดือน
- ใช้เลื่อนการมีประจำเดือน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์
- เป็นโรคผิวดูดเลือด หรือ โรคพอร์ไฟเรีย
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ เนื่องจากที่ตับ
- เป็นหรือเคยเป็น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- มีภาวะเลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ
- เป็นหรือเคยเป็น โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ
- มีภาวะหลอดเลือดอุดตันผิดปกติ เส้นเลือดขด

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก
แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคลมชัก หอบหืด ปวดหัวไมเกรน
- โรคหัวใจ หรือ ไตทำงานผิดปกติ

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำ
อย่างไร**

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไป
โรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมี
อาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรค เช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยานี้ตาม คำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์
ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
 - เจ็บหน้าอกรุนแรง ร้าวมาที่แขนหรือลำคอ หายใจลำบาก
 - ตัวเหลืองตาเหลือง บัสสาวะสีผิดปกติ ปวดท้อง
 - ปวดขารุนแรง ขาบวมผิดปกติ
 - ปวดหัวไมเกรนรุนแรง หรือปวดหัวบ่อยผิดปกติ
 - มองเห็นผิดปกติ มองภาพไม่ชัด
 - พุดไม่ชัด พุดลำบาก แขนขาอ่อนแรง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ปวดหัว เวียนหัว
- ปวดประจำเดือนผิดปกติ ประจำเดือนเลื่อน ประจำเดือนมากระปริบกระปรอย
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง อาเจียน
- คัดตึงเต้านม เต้านมบวม เจ็บเต้านม

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควร เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควร เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำ หองครว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 4 ต.ค.2019