

**คล็อกซาซิลลิน**  
**ความแรง 500 มิลลิกรัม**  
**ชนิดแคปซูล**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า คล็อกซาซิลลินโซเดียม (cloxacillin sodium) มีตัวยา 500 มิลลิกรัม เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเพนิซิลิน

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- โรคติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ไวต่อยานี้ เช่น มีตุ่มพุงพอง หรือมีหนองที่ผิวหนัง มีหนองที่กระดูก

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลิน

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรกระบบทางเดินอาหาร เช่น การดูดซึมผิดปกติ
- เคยเป็นโรคหอบหืดหรือมีประวัติแพ้ยาชนิดอื่น
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาด้านเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเตทรไซคลิน และยาด้านการแข็งตัวของเลือดบางชนิด เช่น วอร์ฟาริน เพราะเสี่ยงทำให้เลือดออกมากขึ้นจากระดับยาที่สูงขึ้น

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ตอนท้องว่าง โดยกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ชักหมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ให้กินยานี้ติดต่อกันครบทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะตัวยยา

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดิบ
- ไข้สูงและเจ็บคอหลังกินยานี้ติดต่อกัน 10 วันขึ้นไป
- เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- บัสสาวะไม่ออก ปวดหลัง บัสสาวะขุ่นหรือมีเลือดปน

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องอืด ถ่ายเหลว
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

<ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ธันวาคม 2561