

ไลน์โซลิด 600 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไลน์โซลิด (linezolid)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้หรือยาอื่นในกลุ่ม ออกซาโซลิดิโนน (oxazolidinones)
- กำลังใช้ยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ได้แก่ ฟีนิลซีน (phenelzine) ไอโซคาร์บอกซาซิด (isocarboxazid)

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ข้ำหรือเลือดออกง่าย
- โลหิตจาง
- ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและอาจจะติดเชื้อได้ง่าย
- มีประวัติโรคลมชัก
- ตับหรือไตบกพร่อง

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำ

3.2. หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

รับประทานยาทันทีที่นึกได้ และรับประทานครั้งต่อไปตามเวลาปกติ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3. ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยาต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะมีคำสั่งหยุดใช้ยา
- ถ้าหยุดยาแล้วกลับเป็นซ้ำให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มี้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ท้องเสียรุนแรง พร้อมทั้งมีมูกเลือด
 - ปัญหาด้านการมองเห็น เช่น เห็นภาพเบลอ การมองเห็นถูกจำกัด
- ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ติดเชื้อราที่อวัยวะเพศหรือปาก
- ปวดศีรษะ
- ลึนรู้สึกเหมือนรับรสโลหะ
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา แยกยาออกจากบรรจุภัณฑ์เมื่อต้องการใช้เท่านั้น
- เก็บยาในที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร