

# เฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ 60 และ 180 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

-เฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine hydrochloride) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้แพ้

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

-ใช้บรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ และบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบตามฤดูกาล

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาเฟกโซเฟนาดีน หรือส่วนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- เป็นผู้สูงอายุ หรือ มีความบกพร่องของไตและตับ
- มีประวัติหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยากกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และอาการใจสั่น
- ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานอนหลับ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยานี้อาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย
- ระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
  - ระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพไม่เป็นที่ยอมรับในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

19 มิถุนายน 2560

## -ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ

-ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียม และแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากจะทำให้การออกฤทธิ์ ของเฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ ลดลง ดังนั้น แนะนำให้รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

-ยาฆ่าเชื้ออีริโทรไมซิน (erythromycin) หรือ คีโตโคนาโซล (ketoconazole) เนื่องจากทำให้ระดับยาของเฟกโซเฟนาดีนไฮโดรคลอไรด์ในเลือดสูงขึ้น

-น้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล หรือน้ำเกรปฟรุต เพราะจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

-ขนาดยาในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คือ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ 180 มิลลิกรัม วันละครั้ง  
-ขนาดยาในเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี ให้ใช้ในขนาด 30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

-ให้รับประทานยาตอนท้องว่าง หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง

### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการกินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปกินยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้หยุดยาและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดเป็นกรดขึ้น

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

กินยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หัวใจเต้นผิดปกติ
- ปฏิกริยาการแพ้ยาที่มีอาการแสดง เช่น บวม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หน้าแดง และเกิดปฏิกริยาการแพ้ต่อระบบร่างกาย

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ ง่วงซึม เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน ท้องอืด ท้องบวม ท้องอืด อาเจียน ท้องเสีย
- นอนไม่หลับ หงุดหงิด นอนหลับผิดปกติ หรือฝันร้าย / ฝันมากผิดปกติ
- เลือดกำเดาไหล ระคายคอ
- ปากแห้ง ผื่นเยื่อเมือกแห้ง
- ใจสั่น อ่อนเพลีย หดแรง

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อน หรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก