

## มานิดิปีน 10 และ 20 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า มานิดิปีน (manidipine) อยู่ในกลุ่มยาควบคุมโรคความดันเลือดสูง

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตบกพร่องร่วมด้วย

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้
- เมื่อตั้งครรภ์ หรือวางแผนว่าจะตั้งครรภ์
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมบุตร

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ภาวะตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรืออาจเกิดอันตรายได้ เช่น ดิจ็อกซิน ไซเมทีดิน

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- รับประทานยาหลังอาหารเช้า

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น หน้ามืด หรือเวียนหัว) ให้รีบไปพบแพทย์

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

#### 4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หากความดันโลหิตลดต่ำมาก หรือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรใช้ยานี้หากต้องทำงานในที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือขับขี่ยานยนต์
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

#### 5.2 อาการที่ไม่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หน้าแดงร้อน ร้อนตามตัว เยื่อบุตาบวม ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น
- มึนงง เวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงนอนมากผิดปกติ หรือชาตามร่างกาย
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อากรมวน ท้องเสีย ท้องอืด ท้องผูก ปากแห้ง
- อ่อนเพลีย บวมตามแขนขา ปัสสาวะน้อย

### 6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย .....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ  
16 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัย  
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร