

ซิมวาสแททิน 10, 20, 40 มิลลิกรัม รูปแบบรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

• ยานี้มีชื่อสามัญว่าซิมวาสแททิน (simvastatin) เป็นยาลดไขมันในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อ
 - ลดไขมันในเลือด
 - ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
- ผู้ที่กำลังใช้ยาต่อไปนี้ เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงต่อกล้ามเนื้อ ได้แก่ ยากินรักษาโรคติดเชื้อบางชนิด (เช่น อีริโทรไมซิน, คลาโรโทรไมซิน) • ยาด้านเชื้อไวรัสเอดส์บางชนิด • ยาด้านเชื้อไวรัสตับอักเสบบางชนิด
- ยาควบคุมความดันโลหิต • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด • ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ • ยาต้านการชัก • ยาต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ • ยาต้านการหดตัวของกล้ามเนื้อ • ยาต้านการอักเสบ • ยาต้านการติดเชื้อ • ยาต้านการเจริญเติบโต • ยาต้านการเจริญเติบโต • ยาต้านการเจริญเติบโต • ยาต้านการเจริญเติบโต

ไขมันในเลือดชื่อเจมไฟโบรซิล • ยา
สอร์โมนชื่อดานาซอล
แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
• ผู้ที่ดื่มน้ำผลไม้เกรปฟรุตมากกว่า 1 ลิตร
ต่อวัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น** • วาร์ฟาริน • ดิจอกซิน • สมุนไพร • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละครั้ง ตอนเย็นหรือก่อนนอน โดยกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาและอันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มี้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กัดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบากหรือ ปัสสาวะออกน้อยลง
 - เมื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล
 - อาการอ่อนแรง เปลี้ย อัมพาต ชัก ใดซิกหนึ่งของร่างกาย
 - หายใจลำบาก ไอแห้ง น้ำหนักลด อ่อนล้า และมีไข้
- #### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- ปวดหัว มึนงง หลงลืม ท้องผูก แสบอก มีแก๊ส ในกระเพาะ ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้
รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้ง
เท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น
เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ

22 มีนาคม 2559

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อ
สงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**