

วาเรนิคลีน
0.5 และ 1 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
[ข้อการค้า]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า วาเรนิคลีนทาร์เทรต (varenicline tartrate) เป็นยาช่วยหยุดสูบบุหรี่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อช่วยหยุดสูบบุหรี่สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือสารประกอบอื่นๆ ในตำรับยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น เช่น
 - โรคหัวใจและหลอดเลือด
 - เคยมีอาการชัก
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
 - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันด้านความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยานี้หลังอาหาร พร้อมดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์มากขึ้น
- ให้หยุดสูบบุหรี่และปรับขนาดการใช้ยาตามทีแพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ อย่างเคร่งครัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีน้ำตาม ผื่นหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ชัก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย
- มึนงง เวียนหัว ง่วงซึม
- ผื่นร้าย ปวดหัว นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง รบกวนการรับรส
- ท้องอืด ปวดท้อง ท้องผูก
- คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทน

จำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร